

	Anwendungsgebiet	Darreichungsform	Vorteile / Besonderheiten	Dosierung	Anwendungsdauer	Packungsgröße
 Voltaren Schmerzgel forte®	Zur Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen, z. B. Sport- oder Unfallverletzung (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Emulsionsgel mit doppelter Konzentration des Wirkstoffs Diclofenac (im Vergleich zu Diclofenac-haltigen topischen Schmerzgele) zum Auftragen auf die Haut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Alternative zur Schmerztablette*</li> <li>Nur zweimal täglich anwenden – bevorzugt morgens und abends</li> <li>Bis zu 12 Stunden Schmerzlinderung</li> <li>Dringt schnell tief ein und konzentriert sich gezielt am Ort der Entzündung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweimal täglich, also alle 12 Stunden (bevorzugt morgens und abends)</li> <li>Je nach Ausmaß der schmerzenden Stelle eine kirsch- bis walnussgroße Menge auftragen und einreiben</li> </ul>	Das Emulsionsgel wird in der Regel über ein bis drei Wochen angewendet, abhängig von den Symptomen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist eine Kurzzeitanwendung bis zu sieben Tagen vorgesehen. Für darüber hinausgehende Behandlungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.	100 g und 150 g Tube (inkl. Komfort-Verschluss).
 Voltaren Schmerzgel®	Zur Behandlung von lokalisierbaren Rückenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren). Bei Jugendlichen ab 14 Jahren zur Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas.	Emulsionsgel mit dem Wirkstoff Diclofenac zum Auftragen und Einreiben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meistverkauftes, rezeptfreies Schmerzgel in Deutschland**</li> <li>Die Nr. 1 bei Rückenschmerzen</li> <li>Stoppt den Schmerz und dessen häufigste Ursache – die Entzündung</li> <li>Das Emulsionsgel pflegt und kühlt zugleich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei- bis viermal täglich, abhängig von der Schmerzintensität</li> <li>Je nach Größe der schmerzenden Stelle eine kirsch- bis walnussgroße Menge auftragen</li> </ul>	Das Emulsionsgel kann bis zu drei Wochen auf die schmerzende Stelle aufgetragen werden, abhängig von der Grunderkrankung. Sollten sich die Beschwerden jedoch nach sieben Tagen nicht verbessern oder gar verschlechtern, konsultieren Sie Ihren Arzt.	60 g, 120 g, 150 g und 180 g Tube (180 g Tube inkl. Komfortverschluss).
 Voltaren Dolo®	Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, z. B. akute Bewegungsschmerzen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Überzogene Tablette zum Einnehmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tablette gegen Rückenschmerzen</li> <li>Stoppt den Schmerz und bekämpft die Ursache, die Entzündung</li> <li>Enthält den bewährten Voltaren®-Wirkstoff</li> <li>Wirkt gezielt am Schmerzort und konzentriert sich an der entzündeten Stelle</li> <li>Der hochpotente Wirkstoff erlaubt eine niedrige Dosierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anfangsdosis von einer Tablette 25 mg</li> <li>Danach je nach Bedarf eine Tablette alle vier bis sechs Stunden</li> <li>Die Tagesdosis sollte drei Tabletten (75 mg) nicht überschreiten</li> <li>Die Tablette mit ausreichend Flüssigkeit und am besten vor einer Mahlzeit einnehmen</li> </ul>	Die Tabletten können bis zu vier Tage ohne ärztlichen Rat eingenommen werden. Bei stärkeren oder länger andauernden Beschwerden sollten Sie mit Ihrem Arzt die Ursachen bzw. die Therapie abklären.	25 mg Tabletten in Packungen zu 10 und 20 Tabletten.
 Voltaren Dolo® Liquid	Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, z. B. akute Bewegungsschmerzen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Weichkapsel zum Einnehmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der flüssige Wirkstoff liegt bereits vollständig gelöst vor und steht deshalb schnell zur Verfügung</li> <li>Der hochpotente Wirkstoff stoppt den Schmerz und bekämpft gezielt die Entzündung, die häufig die Ursache von Bewegungsschmerzen ist</li> <li>Die kleine Weichkapsel ist leicht zu schlucken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anfangsdosis von einer Weichkapsel 25 mg</li> <li>Danach je nach Bedarf eine Weichkapsel alle vier bis sechs Stunden</li> <li>Die Tagesdosis sollte drei Weichkapseln (75 mg) nicht überschreiten</li> <li>Die Weichkapsel mit ausreichend Flüssigkeit und am besten vor einer Mahlzeit einnehmen</li> </ul>	Die Weichkapseln können bis zu vier Tage ohne ärztlichen Rat eingenommen werden. Bei stärkeren oder länger andauernden Beschwerden sollten Sie mit Ihrem Arzt die Ursachen bzw. die Therapie abklären.	25 mg Weichkapseln in Packungen zu 10 und 20 Kapseln.
 Voltaren® Spray	Zur Behandlung von akuten Schmerzen und Entzündungen an kleinen oder mittelgroßen Gelenken und gelenknahen Strukturen, z. B. Sehnen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren). Bei Jugendlichen ab 14 Jahren zur Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas.	Spray mit dem hoch-konzentriertem Wirkstoff Diclofenac zum Aufsprühen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktische und schnelle Hilfe für unterwegs</li> <li>Einfach in Anwendung und Dosierung</li> <li>Innovative Sprühtechnologie mit hochkonzentriertem Wirkstoff Diclofenac</li> <li>Schnelles Eindringen des Wirkstoffs durch die Haut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu dreimal täglich</li> <li>Je vier bis fünf Sprühdosen auf die schmerzende Stelle sprühen</li> </ul>	Das Spray kann bis zu max. sieben Tage angewendet werden. Sollten sich die Beschwerden jedoch nach drei Tagen nicht verbessern oder gar verschlechtern und das Spray länger als sieben Tage zur Schmerzbehandlung benötigt werden, konsultieren Sie Ihren Arzt.	Sprühflasche 25 g (30 ml).
 Voltaren® Wirkstoff-Pflaster	Zur Behandlung von akuten Verstauchungen und Zerrungen des Knöchels sowie bei dem sogenannten Tennisarm (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahren).	Pflaster mit dem Wirkstoff Diclofenac zum Aufkleben auf die Haut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langanhaltende Wirkung (bis zu 24 Stunden): Schmerzlindernd und entzündungshemmend</li> <li>Praktische Anwendung und ideal für unterwegs: passt sich direkt dem Körper an</li> <li>Diskret unter der Kleidung zu tragen</li> <li>Sanft zur Haut, gut haftend und leicht abzulösen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein- bis zweimal täglich, abhängig von dem Anwendungsgebiet (bei Tennisellenbogen je morgens und abends aufkleben; bei Verstauchungen oder Zerrungen des Knöchels einmal pro Tag aufkleben)</li> <li>Das Wirkstoff-Pflaster wird spätestens nach 24 Stunden entfernt</li> </ul>	Das Wirkstoff-Pflaster kann bei Verstauchungen und Zerrungen des Knöchels bis zu drei Tage lang angewendet werden. Bei dem sogenannten Tennisarm ist die Anwendung maximal 14 Tage möglich. Sollten sich die Beschwerden während der empfohlenen Behandlungsdauer nicht verbessern oder gar verschlechtern, konsultieren Sie Ihren Arzt.	Packungen mit 2 und 5 wirkstoffhaltigen Pflastern.
 Voltaflex®	Linderung der Symptome leichter bis mittelschwerer Kniegelenksarthrose.	Tablette mit Glucosamin zum Einnehmen. Zur Förderung der Gelenkgesundheit.	Der körpereigene Baustein Glucosamin stärkt das Knorpelgewebe der Gelenke und fördert somit die Gelenkgesundheit langfristig: stimuliert den Gelenkknorpel <ul style="list-style-type: none"> <li>regt die Bildung von Gelenkflüssigkeit an</li> <li>lindert Arthroseschmerzen im Kniegelenk langfristig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwei Tabletten (einmal am Tag)</li> <li>Die Tabletten sollten mit etwas Flüssigkeit geschluckt werden und können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden</li> </ul>	Glucosamin fördert die Gelenkgesundheit und lindert langfristig die Arthroseschmerzen im Kniegelenk. Eine Schmerzlinderung tritt evtl. erst nach mehrwöchiger Behandlung ein. Ist nach zwei bis drei Monaten keine Linderung zu spüren, kontaktieren Sie Ihren Arzt.	750 mg Tabletten in Packungen zu 30, 60 und 180 Tabletten.

\* Ersetzt eine Tagesdosis rezeptfreie Schmerztablettent \*\* IMS Health OTC Report (YTD April, 2014)