

Beschwerden im Intimbereich?

Das betrifft viele Frauen!



Informationen und
Tipps zur Behandlung mit

KadeFungin®
Milchsäurekur

DR. KADE
PHARMA



➤ Ein unangenehmes Problem: ***bakterielle Scheideninfektion***

➤➤➤ Unangenehm fischartig riechender und vermehrter grau-weißlicher Ausfluss sind typische Merkmale für eine Fehlbesiedelung

der Scheide mit Darmbakterien (auch bakterielle Vaginose genannt). Bis zu 20% aller Frauen sind mindestens einmal in ihrem Leben davon betroffen.

Normalerweise überwiegen im Scheidenmilieu die Milchsäurebakterien, auch Laktobazillen genannt. Sie sorgen für einen günstigen, sauren pH-Bereich von 3,6 bis 4,5. Gemeinsam mit dem natürlichen, leicht trüben und geruchlosen Ausfluss sowie den großen Schamlippen als mechanische Barriere bildet dieser pH-Wert einen natürlichen Schutz vor krankheitserregenden Bakterien. Sind Laktobazillen nicht in optimaler Zahl in der Scheide vorhanden, verringert sich der Säuregrad der Scheide und bestimmte Darmbakterien können sich in der Scheide übermäßig vermehren. Eine bakterielle Vaginose entsteht. Ziel ist es daher, dieses saure Milieu zu bewahren.

➤ Wenn das Scheidenmilieu *aus dem Gleichgewicht gerät*

➤➤➤ Aus verschiedenen Gründen kann die natürliche Scheidenflora aus dem Gleichgewicht geraten.

Hierzu zählen vor allem:

- Hormonelle Schwankungen in der Schwangerschaft, den Wechseljahren oder bedingt durch hormonelle Empfängnisverhütung
- Eine Fehlbesiedelung der Scheide mit Darmbakterien oder mit Bakterien, die während des Geschlechtsverkehrs übertragen wurden
- Ein generell geschwächtes Immunsystem, bedingt durch Krankheit oder Stress



› Schnelle Hilfe bei
gestörtem Scheidenmilieu
KadeFungin® Milchsäurekur

»» Um das Scheidenmilieu zu
stabilisieren und zu regenerieren,
empfiehlt sich bei bakterieller
Vaginose die Anwendung der

KadeFungin® Milchsäurekur. Die übliche Therapie bei bakterieller Vaginose erfolgt mit einem Antibiotikum. Da dieses auch die gesunden Bakterien der Scheidenflora abtötet, sind wiederkehrende Infektionen häufig. KadeFungin® Milchsäurekur kann unterstützend oder alternativ bei bekannter, leichter Symptomatik eingesetzt werden. Das innovative Vaginalgel normalisiert den vaginalen pH-Wert und stimuliert dadurch die Vermehrung der gesunden Milchsäurebakterien. Die lästigen Beschwerden werden schnell und sanft bekämpft.

Übrigens:

Da bakterielle Scheideninfektionen für Frühgeburten verantwortlich sein können, ist ein stabiles Scheidenmilieu in der Schwangerschaft besonders wichtig. Wird durch den Gynäkologen eine pH-Wert-Veränderung festgestellt, eignet sich KadeFungin® Milchsäurekur ideal zur Regulierung des pH-Wertes!



› Therapieempfehlung für **KadeFungin® Milchsäurekur**

Wann? Wie?

Der beste Zeitpunkt für die Anwendung der hygienischen Einmal-Applikatoren ist abends vor dem Schlafengehen, da sich die Wirkung über Nacht am besten entfalten kann.

7-Tage-Kur

zur Regeneration und Stabilisierung der Vaginalflora:

- › **Bei bakterieller Vaginose**
- › **Nach Behandlung von Scheidenpilz**
- › **Während oder nach antibiotischer Therapie zur Vorbeugung von vaginalen Infektionen**
- › **In der Schwangerschaft bei erhöhtem pH-Wert**

2 – 3 Tage

je einen Applikator nach der Menstruation

- › **Zur Erhaltung der natürlichen Balance bei Neigung zu vaginalen Infektionen**

➤ KadeFungin® Milchsäurekur

- Für ein stabiles & gesundes Scheidenmilieu
- Normalisiert den pH-Wert
- Beseitigt schnell die unangenehmen Symptome einer bakteriellen Vaginose wie fischartigen Intimgeruch und vermehrten Ausfluss
- Sehr gute Verträglichkeit – auch in der Schwangerschaft geeignet
- Angenehme Gelkonsistenz mit befeuchtendem Effekt
- 7 hygienisch verpackte Einmal-Applikatoren – auch perfekt für unterwegs
- Ohne Duft- und Farbstoffe



»» Rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich!



DR. KADE
Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin
Tel +49 (0)30 7 20 82-0

www.kade.de