

WELCHE DARREICHUNGSFORM BEVORZUGEN SIE?

Nicotinell Kaugummi

Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 20

> 20

In den ersten 3 Monaten
2 mg Kaugummi

In den ersten 3 Monaten
4 mg Kaugummi

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
2 mg Kaugummi

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
nach Bedarf
2 mg oder
4 mg Kaugummi

Zeitverlauf

Nicotinell 24-Stunden-Pflaster

Monotherapie

Nicotinell Kombinationstherapie

Pflaster + 2 mg Kaugummi

Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 20

> 20

> 20

> 30

3 - 4 Wochen
Beginnen mit
Pflasterstärke 2

3 - 4 Wochen
Beginnen mit
Pflasterstärke 1

3 - 4 Wochen
Beginnen mit
Pflasterstärke 2
+ 2 mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Beginnen mit
Pflasterstärke 1
+ 2 mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2
+ 2 mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2
+ 2 mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3
+ 2 mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3
+ 2 mg Kaugummi

Keine Pflaster, kontinuierliche Reduktion
der 2 mg Kaugummi-Anzahl pro Tag
(bis zu max. 6 Monate nach Beginn)

Nicotinell Lutschtablette

Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 30

> 30

In den ersten 3 Monaten
1 mg Lutschtablette

In den ersten 3 Monaten
2 mg Lutschtablette

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
1 mg Lutschtablette

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
nach Bedarf
1 mg oder
2 mg Lutschtablette

Auch für die **schrittweise**
Entwöhnung

Nur für den **sofortigen** Rauchstopp

Bitte beachten Sie bei der Beratung mögliche **Einschränkungen wie Pflasterunverträglichkeit oder Zahnprothesen**.
Abweichungen vom Dosierschema sind im Einzelfall möglich. Weitere Einzelheiten siehe Gebrauchs- und Fachinformation.