

ALIUD® PHARMA GmbH  
D-89150 Laichingen



## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Alendronsäure AL 70 mg Tabletten

**Wirkstoff: Alendronsäure  
(als Natriumalendronat × 3 H<sub>2</sub>O)**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Alendronsäure AL 70 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg beachten?
3. Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Alendronsäure AL 70 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. Was ist Alendronsäure AL 70 mg und wofür wird es angewendet?

Alendronsäure gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Bisphosphonate genannt werden. Alendronsäure verhindert den Knochenschwund und vermindert das Risiko für Wirbel- und Hüftbrüche.

#### **Alendronsäure AL 70 mg wird angewendet**

- zur Behandlung der Osteoporose. Es wurde gezeigt, dass Alendronsäure bei Frauen das Risiko für Wirbel- und Hüftbrüche vermindert.

Alendronsäure AL 70 mg ist zur **einmal wöchentlichen** Behandlung vorgesehen.

Bei Osteoporose werden die Knochen dünner und schwächer. Zunächst verläuft eine Osteoporose ohne Beschwerden. Unbehandelt kann sie jedoch zu Knochenbrüchen führen. Obwohl diese Knochenbrüche normalerweise schmerzhaft sind, können Wirbelbrüche so lange unbemerkt bleiben, bis sie zu einem Verlust an Körpergröße führen. Die Knochenbrüche können bei normalen Alltagstätigkeiten entstehen, wie z. B. beim Heben von Gegenständen oder durch kleine Verletzungen, die einen gesunden Knochen nicht brechen würden. Die Brüche entstehen gewöhnlich an der Hüfte, Wirbelsäule oder am Handgelenk und können nicht nur Schmerzen, sondern auch erhebliche Probleme wie gebeugte Körperhaltung („Witwenbuckel“) und Verlust der Beweglichkeit verursachen.

Zusätzlich zur Behandlung mit Alendronsäure AL 70 mg kann Ihr Arzt Ihnen Vorschläge zu Veränderungen Ihrer Lebensweise machen, die Ihren Zustand verbessern können. Er wird Ihnen z. B. bestimmte Bewegungsübungen zeigen, Ernährungsempfehlungen geben und empfehlen, dass Sie mit dem Rauchen aufhören. Fragen Sie daher Ihren Arzt, was Sie noch tun können, um Ihre Erkrankung zu bessern.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg beachten?

#### **Alendronsäure AL 70 mg darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Natriumalendronat × 3H<sub>2</sub>O, andere Bisphosphonate oder einen der sonstigen Bestandteile von Alendronsäure AL 70 mg sind (siehe auch unter Abschnitt 6. „Weitere Informationen“ am Ende dieser Gebrauchsinformation).
- wenn Sie unter bestimmten Problemen mit der Speiseröhre (Ösophagus; die Verbindung zwischen Mund und Magen) leiden, wie z. B. eine Verengung der Speiseröhre oder eine Funktionsstörung der Speiseröhre, die zu Schluckbeschwerden führt (sogenannte Achalasie).
- wenn Sie nicht in der Lage sind, mindestens 30 Minuten lang aufrecht zu stehen oder zu sitzen.
- wenn Sie einen niedrigen Calcium-Spiegel im Blut haben.

Nehmen Sie die Tabletten nicht ein, wenn Sie den Eindruck haben, dass einer oder mehrere dieser Umstände auf Sie zutreffen. Sprechen Sie in diesem Fall zuerst mit Ihrem Arzt und folgen Sie seinem Rat (siehe auch unter Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“).

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg ist erforderlich**

Informieren Sie vor Beginn der Einnahme dieser Tabletten Ihren Arzt, wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- wenn Sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben.
- wenn Sie irgendwelche Allergien haben.
- wenn Sie irgendwelche Schluckbeschwerden oder Magen-Darm-Probleme wie eine Magenschleimhautentzündung oder eine Entzündung des Zwölffingerdarms (oberster Abschnitt des Dünndarms) haben oder wenn Sie im letzten Jahr eine schwere Erkrankung von Magen oder Darm hatten wie Geschwüre, Magen- oder Darmblutungen oder Operationen im Bereich von Magen oder Speiseröhre.
- wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie einen Barrett-Ösophagus (eine Erkrankung, die mit Veränderungen der Zellen, die die untere Speiseröhre auskleiden, einhergeht) haben.
- wenn Ihr Körper nur schlecht Calcium aufnimmt oder wenn Sie unter anderen Erkrankungen leiden, die zu niedrigen Calcium-Spiegeln im Blut führen kann, wie z. B. ein Vitamin-D-Mangel oder ein so genannter Hypoparathyreoidismus (bei dieser Erkrankung ist die Funktion der Nebenschilddrüsen gestört). Ihr Arzt kann Ihnen in diesem Fall ein Präparat mit Calcium oder Vitamin D verordnen, um zu verhindern, dass Ihr Calcium-Spiegel im Blut absinkt.
- wenn Sie Schmerzen oder eine Schwellung im Bereich von Zahnfleisch und/oder Kiefer haben oder in der Vergangenheit hatten, bei Taubheits- oder Druckgefühl im Kiefer oder wenn Ihnen ein Zahn ausgefallen ist. Diese Beschwerden könnten auf eine so genannte Osteonekrose (Absterben von Knochengewebe) hindeuten.
- wenn eine der folgenden Bedingungen auf Sie zutrifft, wird Ihr Arzt möglicherweise eine zahnärztliche Untersuchung anordnen, bevor Sie mit der Behandlung mit Alendronsäure AL 70 mg beginnen:
  - wenn Sie Krebs haben
  - wenn Sie Steroide (Kortisonpräparate z. B. zur Behandlung von Entzündungsreaktionen) einnehmen
  - wenn Sie eine Zahnfleischerkrankung haben
  - wenn Sie eine Chemotherapie oder Strahlentherapie erhalten
  - wenn Ihre Zähne in einem schlechten Zustand sind
  - wenn Sie Raucher sind.

Während der Behandlung kann es zu Reizungen, Entzündungen oder Geschwüren der Speiseröhre (Ösophagus; die Verbindung zwischen Mund und Magen) kommen oft begleitet von Schmerzen im Brustkorb, Sodbrennen und Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Schlucken. Diese Beschwerden können insbesondere dann auftreten, wenn Sie die Anwendungshinweise in dieser Gebrauchsinformation bzw. die Anweisungen Ihres Arztes nicht richtig befolgen (siehe unter Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“). Beenden Sie die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf, wenn bei Ihnen solche Beschwerden auftreten (siehe auch Abschnitt 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“). Wenn Sie diese Beschwerden nicht beachten und die Tabletten weiter einnehmen, werden sich Ihre Beschwerden im Bereich der Speiseröhre sehr wahrscheinlich verschlimmern.

Informieren Sie Ihren Zahnarzt, dass Sie Alendronsäure AL 70 mg einnehmen, wenn Sie sich momentan in einer zahnärztlichen Behandlung befinden, sich einer zahnärztlichen Operation unterziehen sollen oder Ihnen ein Zahn gezogen werden soll.

Diese Tabletten können die Calcium- und Phosphat-Spiegel im Blut beeinflussen. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihren Arzt über die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg informieren, wenn bei Ihnen Blutuntersuchungen durchgeführt werden sollen.

#### Kinder und Jugendliche

Alendronsäure AL 70 mg sollte nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden.

#### **Bei Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bitte Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie derzeit **Glukokortikoide** (Arzneimittel, die z. B. zur Behandlung von Entzündungsreaktionen eingesetzt werden) einnehmen. Möglicherweise sind zusätzliche Untersuchungen vor der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg erforderlich, wie z. B. zahnärztliche Untersuchungen.

Die gleichzeitig Anwendung von **bestimmten Schmerzmitteln** (z. B. **Acetylsalicylsäure** oder **Ibuprofen**) und Alendronsäure AL 70 mg kann zu Magenbeschwerden führen.

Folgende Substanzen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Alendronsäure AL 70 mg die Aufnahme der Alendronsäure in den Körper beeinflussen:

- **Calcium-haltige Präparate**
- **Antazida** (bei Sodbrennen) und
- **einige andere Arzneimittel zum Einnehmen.**

Sie müssen nach der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg daher mindestens 30 Minuten warten, bevor Sie andere Arzneimittel einnehmen (siehe auch Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“).

#### **Bei Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nahrungsmittel und Getränke (einschließlich von Mineralwasser) können die Wirksamkeit von Alendronsäure AL 70 mg bei gleichzeitiger Einnahme beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, dass Sie die Anwendungshinweise unter Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“ befolgen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

*Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.*

#### Schwangerschaft

Sie sollten Alendronsäure AL 70 mg nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft vermuten.

#### Stillzeit

Sie sollen Alendronsäure AL 70 mg nicht einnehmen, wenn Sie stillen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Alendronsäure AL 70 mg kann bestimmte Nebenwirkungen (einschließlich Schwindel, Schwindel und starke Knochen-, Muskel- oder Gelenkschmerzen) hervorrufen, welche Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen können. Die Reaktion auf Alendronsäure AL 70 mg kann individuell verschieden ausfallen (siehe Abschnitt 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“).

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Alendronsäure AL 70 mg**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Alendronsäure AL 70 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### 3. Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?

*Nehmen Sie Alendronsäure AL 70 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.*

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis von Alendronsäure AL 70 mg:

- **1-mal wöchentlich** 1 Tablette (wählen Sie dafür immer den gleichen Wochentag).

Es ist sehr wichtig, dass Sie die folgenden Anweisungen genau einhalten, damit Ihr Arzneimittel möglichst gut wirken kann und das Risiko für eine Verletzung der Speiseröhre gemindert wird:

1. Nehmen Sie Alendronsäure AL 70 mg nach dem Aufstehen und vor der Aufnahme irgendwelcher Nahrungsmittel, Getränke sowie vor der Einnahme jeglicher anderer Arzneimittel im Ganzen nur **mit 1 vollen Glas Wasser** (mindestens 200 ml; kein Mineralwasser!) ein.
  - Nehmen Sie die Tablette nicht mit Mineralwasser ein (weder stilles noch kohlenensäurehaltiges Mineralwasser).

Alendronsäure AL 70 mg Tabletten  
AMNOG  
BPZ 148x520  
Bogen: Schwarz (Black)  
9237595 1110 05798.90003



- Nehmen Sie die Tablette nicht mit Kaffee oder Tee ein.
  - Nehmen Sie die Tablette nicht mit Säften oder Milch ein.
2. Sie dürfen die Tablette nicht kauen oder zerbrechen/zermahlen oder im Mund zergehen lassen.
  3. Legen Sie sich nicht hin, sondern bleiben Sie nach der Einnahme der Tablette **mindestens 30 Minuten lang in aufrechter Position** (im Sitzen, im Stehen oder im Gehen). Legen Sie sich frühestens nach der ersten Nahrungsaufnahme an diesem Tag wieder hin.
  4. Warten Sie nach der Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg **mindestens 30 Minuten, bevor Sie Ihre erste Nahrung, Getränke oder andere Arzneimittel** wie Antazida, Calcium- oder Vitaminpräparate an diesem Tag einnehmen. Alendronsäure AL 70 mg ist nur wirksam, wenn die Tablette auf nüchternen (leeren) Magen eingenommen wird.
  5. Nehmen Sie Alendronsäure AL 70 mg nicht vor dem Zubettgehen und nicht morgens vor dem ersten Aufstehen ein.
  6. Wenn bei Ihnen Schluckbeschwerden, Schmerzen beim Schlucken oder Brustschmerzen auftreten oder Sie ein neues oder sich verstärkendes Sodbrennen bemerken, nehmen Sie Alendronsäure AL 70 mg nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt auf.
  7. Es ist wichtig, dass Sie Alendronsäure AL 70 mg so lange einnehmen, wie Ihr Arzt es Ihnen verordnet hat. Ihre Osteoporose kann mit Alendronsäure AL 70 mg nur behandelt werden, wenn Sie die Tabletten kontinuierlich einnehmen.

**Wenn Sie eine größere Menge Alendronsäure AL 70 mg eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich zu viele Tabletten eingenommen haben, trinken Sie ein volles Glas Milch, um die Aufnahme des Wirkstoffs in den Körper zu vermindern, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Vermeiden Sie Maßnahmen, die zum Erbrechen führen, und legen Sie sich nicht hin.

Eine Überdosierung mit Alendronsäure AL 70 mg kann unter anderem zu den folgenden Beschwerden bzw. Störungen führen:

- Niedriger Calcium-Spiegel im Blut mit Beschwerden wie Missempfindungen auf der Haut wie z.B. Taubheitsgefühl, Brennen, Prickeln, Jucken oder Kribbeln (Parästhesien) oder unbeabsichtigten Muskelzuckungen
- Niedriger Phosphat-Spiegel im Blut mit Beschwerden wie Funktionsstörungen der Muskulatur und Schwäche
- Magenbeschwerden und Sodbrennen
- Entzündungen der Speiseröhre oder Magenschleimhaut und Geschwürbildung.

**Wenn Sie die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg vergessen haben**

Wenn Sie die Einnahme einer Tablette versäumt haben, nehmen Sie die Tablette am nächsten Morgen ein, nachdem Sie Ihr Versäumnis bemerkt haben. Nehmen Sie nicht zwei Tabletten innerhalb einer Woche oder an einem Tag ein, sondern führen Sie die Einnahme von einer Tablette pro Woche am dafür vorgesehenen Wochentag fort. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Wenn Sie die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg abbrechen**

Fragen Sie immer zuerst Ihren Arzt, wenn Sie die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg beenden oder das Ihnen verordnete Einnahmeschema ändern möchten. Unterbrechen oder beenden Sie die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Alendronsäure AL 70 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Beenden Sie die Einnahme von Alendronsäure AL 70 mg und suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf, wenn Sie eines der folgenden Symptome bei sich bemerken:

- Beschwerden, die auf eine schwere allergische Reaktion (ein so genanntes Angioödem; tritt selten auf) hindeuten wie
  - Anschwellen von Gesicht, Zunge oder Rachen und/oder
  - Schluckbeschwerden und Atembeschwerden und/oder
  - Quaddeln (Nesselsucht)
- schwere Hautreaktionen (treten sehr selten auf) wie ein Hautausschlag, Blasenbildung oder andere Veränderungen im Bereich von Haut, Augen, Mund oder Geschlechtsorganen, Juckreiz oder Fieber (es handelt sich um Beschwerden im Zusammenhang mit Hautreaktionen, die Stevens-Johnson-Syndrom bzw. toxische epidermale Nekrolyse genannt werden)
- Brustschmerz, neu auftretendes oder sich verschlechterndes Sodbrennen, Schluckbeschwerden oder Schmerzen beim Schlucken (diese Beschwerden könnten auf eine Reizung, Entzündung oder Geschwürbildung im Bereich der Speiseröhre hindeuten; dies tritt gelegentlich auf).

Wenn Sie diese Beschwerden nicht beachten und die Tabletten weiter einnehmen, werden sich Ihre Beschwerden im Bereich der Speiseröhre sehr wahrscheinlich verschlimmern.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	mehr als 1 Behandelte von 10
<i>Häufig:</i>	1 bis 10 Behandelte von 100
<i>Gelegentlich:</i>	1 bis 10 Behandelte von 1000
<i>Selten:</i>	1 bis 10 Behandelte von 10000
<i>Sehr selten:</i>	weniger als 1 Behandelte von 10000

*Häufigkeit nicht bekannt:* Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Häufig:**

- Kopfschmerzen
- Bauchschmerzen
- Magenbeschwerden oder Aufstoßen nach dem Essen, Verstopfung
- Völlegefühl oder aufgetriebener Bauch
- Durchfall
- Blähungen
- Knochen-, Muskel- und/oder Gelenkschmerzen.

**Gelegentlich:**

- Übelkeit
- Erbrechen
- Reizungen oder Entzündungen der Speiseröhre oder des Magens
- Schädigung der Schleimhaut der Speiseröhre (Ösophaguserosionen) (siehe Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“)
- Schwarzer oder teerähnlicher Stuhl
- Hautausschlag
- Juckreiz
- gerötete Haut.

**Selten:**

- Verschwommensehen, Augenschmerzen oder gerötete Augen
- Verengung der Speiseröhre (siehe Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“)
- Geschwüre im Mund oder Rachen, wenn die Tabletten zerkaut oder gelutscht wurden (siehe Abschnitt 3. „Wie ist Alendronsäure AL 70 mg einzunehmen?“)
- Geschwürbildung im Magen oder Darm (manchmal schwerwiegend oder mit Blutungen)
- Ein Hautausschlag, der sich durch Sonneneinstrahlung verstärkt
- Vorübergehende, grippeähnliche Beschwerden wie Muskelschmerzen, allgemeines Unwohlsein und manchmal Fieber, die gewöhnlich zu Beginn der Behandlung auftreten
- Beschwerden im Zusammenhang mit einem niedrigen Calcium-Spiegel im Blut wie Muskelkrämpfe oder -spasmen und/oder ein Gefühl von Kribbeln in den Fingern oder um den Mund
- starke Knochen-, Muskel- und/oder Gelenkschmerzen
- Kieferprobleme (Osteonekrose) in Verbindung mit verzögerter Wundheilung und Infektionen, oft nach dem Ziehen von Zähnen.

Ungewöhnliche (atypische) Brüche des Oberschenkelknochens, insbesondere bei Patienten unter Langzeitbehandlung gegen Osteoporose, können selten auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Schmerzen, Schwäche oder Beschwerden in Oberschenkel, Hüfte oder Leiste verspüren, da es sich dabei um ein frühes Anzeichen eines möglichen Oberschenkelknochenbruchs handeln könnte.

**Häufigkeit nicht bekannt:**

- Leichte und vorübergehende Abnahme der Calcium- und Phosphat-Spiegel im Blut ohne besondere Beschwerden
- Gelenkschwellungen
- Haarausfall (Alopezie)
- Schwindel
- Müdigkeit/Schwäche
- Schwellungen an Händen oder Beinen
- Geschmacksstörungen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker umgehend, wenn Sie diese oder andere ungewöhnliche Symptome bemerken.

Es ist hilfreich, wenn Sie notieren, welche Beschwerden bei Ihnen aufgetreten sind, wann sie begonnen haben und wie lange sie angehalten haben.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. Wie ist Alendronsäure AL 70 mg aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über + 25°C lagern!

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen!

Arzneimittel sollten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

**6. Weitere Informationen**

**Was Alendronsäure AL 70 mg enthält**

Der Wirkstoff ist Alendronsäure (als Natriumalendronat×3 H<sub>2</sub>O).

1 Tablette enthält 70 mg Alendronsäure (als Natriumalendronat×3 H<sub>2</sub>O).

Die sonstigen Bestandteile sind: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.).

**Wie Alendronsäure AL 70 mg aussieht und Inhalt der Packung**

Weiß bis gebrochen weiß, ovale Tablette mit der Prägung „AN 70“ auf einer Seite und einem Logo (Pfeil-Symbol) auf der anderen Seite.

Alendronsäure AL 70 mg ist in Packungen mit 4, 12 und 24 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

**ALIUD® PHARMA GmbH**

**Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen**

**E-Mail: info@aliud.de**

Hersteller

**STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im**

Juli 2011

Alendronsäure AL 70 mg Tabletten  
AMNOG  
BPZ 148x520  
Bogen: Schwarz (Black)  
9237595 1110 05798.90003

9237595 1110

05798.90003

