

Sanum

Alkala T Tabletten



Darreichungsform:	Tabletten zum Einnehmen
Wirkstoff:	Natriumhydrogencarbonat
Zusammensetzung:	1 Tablette enthält: 1 g Natriumhydrogencarbonat. Sonstige Bestandteile: Lactose, Cellulose, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, Saccharin-Natrium, Gummi arabicum, Maltodextrin, Pfefferminzöl.
Indikation:	Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
Anwendung:	3 mal täglich 1 Tablette mit Flüssigkeit einnehmen. Grundsätzlich sollte ein Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen der Einnahme von Alkala T und der von anderen Arzneimitteln eingehalten werden.
Nebenwirkungen:	Häufig sind nach der Einnahme von Alkala T Völlegefühl und Aufstoßen aufgetreten. Lang anhaltender Gebrauch kann die Bildung von Kalzium- und Magnesiumphosphatsteinen in der Niere begünstigen.
Gegenanzeigen:	Alkala T darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile. Bei Störungen im Säure-Basen-Haushalt (Alkalose), Kaliummangel oder bei Durchführung einer natriumarmen Diät darf Alkala T nicht eingenommen werden. Bei Säureverätzung des Magens darf Alkala T nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Galactose-Unverträglichkeit (Galactose-Intoleranz), einem

genetischen Lactasemangel oder einer
Glucose-Galactose-Malabsorption.

Wechselwirkungen:	Natriumhydrogencarbonat ist mit den meisten Arzneimitteln unverträglich. Über die Erhöhung des pH-Wertes im Magen und Harn kann die Resorption und Ausscheidung von schwachen Säuren und Basen beeinflusst werden. Funktionelle Wechselwirkungen sind mit Gluco- und Mineralocorticoiden, Androgenen und Diuretika, die die Kaliumausscheidung erhöhen, möglich.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Alkala T bei Schwangeren, während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Wegen der Gefahr der Magenruptur darf Alkala T bei Säureverätzung des Magens nicht angewendet werden.
Handelsform:	Packung mit 20/100 Tabletten, Bündelpackung mit 10x 100 Tabletten.
