

Aranicyn Leber-Gallemittel

Mischung

Intestinum

Pflanzliche Urtinkturen / Potenzen

Bei Leber-Galle-Störungen

Wirkstoffe (10 ml enthalten):		Monographien	Ergänzende Symptomauswahl
Berberis vulgaris Ø	0,03 ml	Erkrankungen der Leber und Gallenblase	Galliges Aufstoßen, Meteorismus, Übelkeit
Cynara scolymus (HAB 34) Ø (HAB, V3a)	1,00 ml	Störungen des Leber-Galle-Systems	
Lycopodium clavatum Dil. D4	0,075 ml	Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems	Gallenkoliken, Völlegefühl, Erbrechen
Taraxacum officinale Ø	1,00 ml	Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems	Gallige Durchfälle, Übelkeit, Druck und Völlegefühl, Schmerzen in der Lebergegend

Anwendungsgebiete	Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Leber-Galle-Störungen.
Gegenanzeigen	Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenvereiterung, Darmverschluss; bei Gallensteinleiden nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen	Bei Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt, bei Kindern unter 12 Jahren nicht anwenden.
Nebenwirkungen	Keine bekannt.
Wechselwirkungen	Keine bekannt.
Hinweis	Enthält 52 Vol.-% Alkohol.
Dosierung	Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 x täglich 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Packungsgröße	50 ml Mischung