

## Araniforce®-T Tabletten

### Muskel / Gelenke

Homöopathisches Komplexmittel (Potenzen)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

<b>Wirkstoffe</b> (1 Tablette enthält):	<b>Monographien</b>	<b>Ergänzende Symptomauswahl</b>
Acidum silicicum Trit. D6	30,00 mg Chron. Entzündungen und Gewebschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke	Gelenkschmerzen, Steifigkeit der Glieder
Alchemilla vulgaris Trit. D6	30,00 mg (Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Entzündliche Prozesse)	
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D6	30,00 mg Kalziumstoffwechselstörungen	Rheumatische Schmerzen in Knochen und Gelenken
Calcium phosphoricum Trit. D6	30,00 mg Wirbelsäulenerkrankung, Kalziummangelzustände	Rückenschwäche, rheumatische Gelenkschmerzen
Equisetum arvense (HAB 34) Trit. D6 (HAB V2a)	30,00 mg (Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Niere, entzündliche Prozesse)	Ilio-Sacralschmerzen
Ilex aquifolium (HAB 34) Trit. D6 (HAB V2a)	30,00 mg (Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Entzündliche Prozesse)	
Symphytum (HAB 34) Trit. D6 (HAB V3a)	30,00 mg Knochen und Knochenhautverletzungen	Rheumatische und traumatische Knochenschmerzen
<b>Anwendungsgebiete</b>	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.	
<b>Gegenanzeigen</b>	Keine bekannt.	
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	Bei Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt, bei Kindern unter 12 Jahren nicht anwenden.	
<b>Warnhinweis</b>	Dieses Arzneimittel enthält Lactose.	
<b>Nebenwirkungen</b>	Keine bekannt.	
<b>Wechselwirkungen</b>	Keine bekannt.	
<b>Dosierung</b>	Soweit nicht anders verordnet, 1-3 x täglich je 1 Tablette einnehmen.  Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren	
<b>Packungsgröße</b>	100 Tabletten	