

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten.

Wirkstoff: Bicalutamid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bicalutamid Bluefish 50 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg beachten?
3. Wie ist Bicalutamid Bluefish 50 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bicalutamid Bluefish 50 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Bicalutamid Bluefish 50 mg wird zur Behandlung eines fortgeschrittenen Prostatakarzinoms angewendet. Es wird gemeinsam mit einem Arzneimittel genannt LHRH („luteinising hormone-releasing hormone“)-Analog angewendet, das den Spiegel der Androgene (männliche Geschlechtshormone) im Körper verringert, oder in Zusammenhang mit der chirurgischen Entfernung der Hoden.

Bicalutamid Bluefish 50 mg gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als nicht-steroidale Antiandrogene bezeichnet werden. Der Wirkstoff Bicalutamid blockiert den unerwünschten Effekt der männlichen Geschlechtshormone (Androgene) und hemmt so das Zellwachstum in der Prostata.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG BEACHTEN?

Bicalutamid Bluefish 50 mg darf nicht eingenommen werden

(nur absolute Kontraindikationen wie in Abschnitt 4.3 der SPC)

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Bicalutamid oder einen der sonstigen Bestandteile von Bicalutamid Bluefish 50 mg sind.
- wenn Sie Terfenadin (gegen Heuschnupfen oder Allergien), Astemizol (gegen Heuschnupfen oder Allergien) oder Cisaprid (gegen Magenbeschwerden) anwenden.

Bicalutamid Bluefish 50 mg sollte nicht von Frauen angewendet werden und darf nicht an Kinder und Jugendliche verabreicht werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg ist erforderlich

- wenn Ihre Leberfunktion mittelstark bzw. stark beeinträchtigt ist. Das Arzneimittel darf in diesem Fall nur angewendet werden, nachdem Ihr Arzt den möglichen Nutzen und die möglichen Risiken sorgfältig gegeneinander abgewogen hat. Ist dies der Fall, überprüft Ihr Arzt regelmäßig Ihre Leberfunktion (Bilirubin, Transaminasen, alkalische Phosphatase). Bei Auftreten schwerer Leberfunktionsstörungen muss die Behandlung mit Bicalutamid abgesetzt werden.
- wenn Ihre Nierenfunktion stark beeinträchtigt ist. Das Arzneimittel darf in diesem Fall nur angewendet werden, nachdem Ihr Arzt den möglichen Nutzen und die möglichen Risiken sorgfältig gegeneinander abgewogen hat.
- wenn Sie eine Herzkrankheit haben. In diesem Fall sollte Ihr Arzt Ihre Herzfunktion regelmäßig kontrollieren.

Bei Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wenn Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg gemeinsam mit einem der folgenden Arzneimittel einnehmen, könnte die Wirkung von Bicalutamid und die des anderen Arzneimittels beeinflusst werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie eines dieser Arzneimittel gemeinsam mit Bicalutamid Bluefish 50 mg anwenden.

Bluefish Pharmaceuticals				Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.	
Product name	Bicalutamid Bluefish Tablets		Artwork code	XXXXX	
Strength	50 mg		Packs	4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?	
Country	Germany		Manufacturer	Genepharma	
Dimension	150 x 300 mm		Artwork made to	100%	
Component	Leaflet		Date:	23.01.2009	
Braille				140 mm	

Bei Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bicalutamid Bluefish 50 mg kann vor, während oder nach einer Mahlzeit, jedoch auch außerhalb der Mahlzeiten eingenommen werden. Die Filmtablette Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtablette enthält etwas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit geschluckt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bicalutamid Bluefish 50 mg ist bei Frauen kontraindiziert und darf nicht an Schwangere oder stillende Mütter verabreicht werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bicalutamid Bluefish 50 mg sollte Ihre Verkehrstüchtigkeit und Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen nicht beeinträchtigen.

Bei manchen Patienten kann sich jedoch nach der Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg ein Benommenheitsgefühl einstellen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie bei solchen Tätigkeiten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, besonders vorsichtig sein.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bicalutamid Bluefish 50 mg

Bicalutamid Bluefish 50 mg enthält Lactose. Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Der Arzt verschreibt Ihnen eine geeignete Dosierung, die nur für Sie bestimmt ist. Die übliche Dosis besteht aus einer Filmtablette einmal täglich. Lesen Sie die Angaben auf dem Packungsetikett.

Kinder und Jugendliche: Dieses Arzneimittel wird für Patienten unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Bicalutamid Bluefish 50 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viele Tabletten eingenommen haben, suchen Sie so bald wie möglich Ihren Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Nehmen Sie die restlichen Tabletten oder die Verpackung mit, damit der Arzt feststellen kann, was Sie eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg vergessen haben

Wenn Sie vergessen, Ihre tägliche Dosis einzunehmen und sich später daran erinnern, lassen Sie die vergessene Dosis aus und nehmen Sie Ihre nächste Dosis zur üblichen Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg abbrechen

Brechen Sie die Einnahme Ihrer Filmtabletten nicht ab, auch wenn Sie sich gesund fühlen, es sei denn, es wird Ihnen von Ihrem Arzt angeraten.

zur Verfügung gestellt von Gebrauch.info

Bluefish Pharmaceuticals

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Product name	Bicalutamid Bluefish Tablets		Artwork code	XXXXX	
Strength	50 mg		Packs	4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?	
Country	Germany		Manufacturer	Genepharma	
Dimension	150 x 300 mm		Artwork made to	100%	
Component	Leaflet		Date:	23.01.2009	
Braille				140 mm	

Bei Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bicalutamid Bluefish 50 mg kann vor, während oder nach einer Mahlzeit, jedoch auch außerhalb der Mahlzeiten eingenommen werden. Die Filmtablette Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtablette enthält etwas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit geschluckt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bicalutamid Bluefish 50 mg ist bei Frauen kontraindiziert und darf nicht an Schwangere oder stillende Mütter verabreicht werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bicalutamid Bluefish 50 mg sollte Ihre Verkehrstüchtigkeit und Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen nicht beeinträchtigen.

Bei manchen Patienten kann sich jedoch nach der Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg ein Benommenheitsgefühl einstellen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie bei solchen Tätigkeiten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, besonders vorsichtig sein.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bicalutamid Bluefish 50 mg

Bicalutamid Bluefish 50 mg enthält Lactose. Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Der Arzt verschreibt Ihnen eine geeignete Dosierung, die nur für Sie bestimmt ist. Die übliche Dosis besteht aus einer Filmtablette einmal täglich. Lesen Sie die Angaben auf dem Packungsetikett.

Kinder und Jugendliche: Dieses Arzneimittel wird für Patienten unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Bicalutamid Bluefish 50 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viele Tabletten eingenommen haben, suchen Sie so bald wie möglich Ihren Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Nehmen Sie die restlichen Tabletten oder die Verpackung mit, damit der Arzt feststellen kann, was Sie eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg vergessen haben

Wenn Sie vergessen, Ihre tägliche Dosis einzunehmen und sich später daran erinnern, lassen Sie die vergessene Dosis aus und nehmen Sie Ihre nächste Dosis zur üblichen Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg abbrechen

Brechen Sie die Einnahme Ihrer Filmtabletten nicht ab, auch wenn Sie sich gesund fühlen, es sei denn, es wird Ihnen von Ihrem Arzt angeraten.

Bluefish Pharmaceuticals

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Product name	Bicalutamid Bluefish Tablets		Artwork code	XXXXX	
Strength	50 mg		Packs	4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?	
Country	Germany		Manufacturer	Genepharma	
Dimension	150 x 300 mm		Artwork made to	100%	
Component	Leaflet		Date:	23.01.2009	
Braille				140 mm	

Bei Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bicalutamid Bluefish 50 mg kann vor, während oder nach einer Mahlzeit, jedoch auch außerhalb der Mahlzeiten eingenommen werden. Die Filmtablette Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtablette enthält etwas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit geschluckt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bicalutamid Bluefish 50 mg ist bei Frauen kontraindiziert und darf nicht an Schwangere oder stillende Mütter verabreicht werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bicalutamid Bluefish 50 mg sollte Ihre Verkehrstüchtigkeit und Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen nicht beeinträchtigen.

Bei manchen Patienten kann sich jedoch nach der Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg ein Benommenheitsgefühl einstellen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie bei solchen Tätigkeiten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, besonders vorsichtig sein.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bicalutamid Bluefish 50 mg

Bicalutamid Bluefish 50 mg enthält Lactose. Bitte, nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Der Arzt verschreibt Ihnen eine geeignete Dosierung, die nur für Sie bestimmt ist. Die übliche Dosis besteht aus einer Filmtablette einmal täglich. Lesen Sie die Angaben auf dem Packungsetikett.

Kinder und Jugendliche: Dieses Arzneimittel wird für Patienten unter 18 Jahren nicht empfohlen.

3. WIE IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Bicalutamid Bluefish 50 mg nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Der Arzt verschreibt Ihnen eine geeignete Dosierung, die nur für Sie bestimmt ist. Die übliche Dosis besteht aus einer Filmtablette einmal täglich. Lesen Sie die Angaben auf dem Packungsetikett.

Kinder und Jugendliche: Dieses Arzneimittel wird für Patienten unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Bicalutamid Bluefish 50 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viele Tabletten eingenommen haben, suchen Sie so bald wie möglich Ihren Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Nehmen Sie die restlichen Tabletten oder die Verpackung mit, damit der Arzt feststellen kann, was Sie eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg vergessen haben

Wenn Sie vergessen, Ihre tägliche Dosis einzunehmen und sich später daran erinnern, lassen Sie die vergessene Dosis aus und nehmen Sie Ihre nächste Dosis zur üblichen Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid Bluefish 50 mg abbrechen

Brechen Sie die Einnahme Ihrer Filmtabletten nicht ab, auch wenn Sie sich gesund fühlen, es sei denn, es wird Ihnen von Ihrem Arzt angeraten.

Nebenwirkungen sind sehr selten (geschätzte Häufigkeit: weniger als 1 Behandler von 10.000):

- Schwere Störungen der Leberfunktion (Leberversagen).
- Magenschmerzen und Herzversagen (die zusammen mit Atemnot, besonders bei Anstrengungen, Herzrasen, anschwellen der Gliedmaßen und Fleckung der Haut auftreten können), unregelmäßiger Herzschlag, Anomalien beim EKG.
- Geringere Anzahl der Blutplättchen was das Risiko von Blutungen oder Blutergüssen erhöht.

Gelegentlich kann Bicalutamid Bluefish 50 mg Veränderungen Ihres Blutes hervorrufen, die Ihren Arzt dazu veranlassen könnten, bestimmte Bluttests durchzuführen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST BICALUTAMID BLUEFISH 50 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen Bicalutamid Bluefish 50 mg nicht in der Blisterpackung und der Schachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Hausabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Bicalutamid Bluefish 50 mg enthält

- Der Wirkstoff ist Bicalutamid. 1 Blisterpackung enthält 50 mg Bicalutamid.

Tablettenkern:

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Povidon (K-25), Carboxymethylstärke-Natrium (K-100), A)(Ph.Eur.), Magnesiumstearat.

Filmbeschichtung:

Opadry OY-S-9622 mit Hypromellose, Titandioxid (E171) und Propylenglycol.

Wie Bicalutamid Bluefish 50 mg aussieht und Inhalt der Packung

Bicalutamid Bluefish 50 mg liegt in Form von weißen, runden, bikonvexen Filmtabletten vor. Die Filmtablette sind in Blisterpackungen zu 30 oder 90 Filmtabletten verpackt.

Pharmazeutischer Unternehmer

Bluefish Pharmaceuticals AB
Birger Jarlgatan 37
SE-111 45 Stockholm
Schweden.

Hersteller

Genepharma S.A.
18th klm Marathonos Avenue
153 51 Pallini Attikis
Griechenland

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Dänemark	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmovertrukne tabletter
Deutschland	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten
Finnland	Kalvopäällysteistä tablettia
Italien	Bicalutamide Bluefish 50 mg Comprime rivestite con film
Niederlande	Bicalutamide Bluefish 50 mg Filmomhulde tabletten
Norwegen	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmdrasjerte tabletter
Österreich	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten
Spanien	Bicalutamida Bluefish 50 mg Comprimidos recubiertos con película EFG
Schweden	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmdragerade tabletter
Tschechische Republik	Potahovanych tablet
Ungarn	Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtablettá
Vereinigtes Königreich	Bicalutamide 50 mg film-coated tablets

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 07/2009.