

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bismutum / Stibium und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bismutum / Stibium beachten?
3. Wie ist Bismutum / Stibium anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?



Bismutum / Stibium

Creme

1. Was ist Bismutum / Stibium und wofür wird es angewendet?

Bismutum / Stibium ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Hauterkrankungen.

Es enthält die Wirkstoffe: Bismutum metallicum D1 und Stibium metallicum praeparatum D1.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Strukturierung der Haut bei Deformationen, z. B. Warzen, vermehrte Hornhautbildung (Hyperkeratose), Ekzeme.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bismutum / Stibium beachten?**Bismutum / Stibium darf nicht angewendet werden:**

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe,
- bei Säuglingen sowie Kleinkindern bis zu einem Körpergewicht von 25 kg,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei anhaltenden, unklaren oder wiederkehrenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Bismutum / Stibium enthält Stoffe, die bei länger dauernder Anwendung bei Patienten mit schlecht heilenden Wunden oder Geschwüren sehr häufig Allergien verursachen. Falls Sie Bismutum / Stibium auf länger bestehenden Wunden anwenden, achten Sie bitte daher besonders auf das Auftreten von Juckreiz, Rötung und Schwellung der umgebenden Haut. Falls Sie derartige Anzeichen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung von Bismutum / Stibium und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Bismutum / Stibium anzuwenden?

Wenden Sie Bismutum / Stibium immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: bis zu 6 cm Cremestrang 1 - 2 mal täglich in die Haut einreiben (6 cm Cremestrang = 3 g Creme).

Kinder ab einem Körpergewicht von 25 kg: bis zu 6 cm Cremestrang 1 mal täglich in die Haut einreiben. Die maximale Tagesdosis sollte bei Kindern nicht überschritten werden.

Bismutum / Stibium soll nicht großflächig angewendet werden.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Die Dauer der Behandlung chronischer Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Bismutum / Stibium sollte nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.

Wenn Sie die Anwendung von Bismutum / Stibium vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Bismutum / Stibium Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Bismutum / Stibium, insbesondere Paraffin, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Bei Auftreten von Hautrötungen, eventuell verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Bismutum / Stibium und suchen Sie ggf. Ihren Arzt auf.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine aufgeführte Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

Zusammensetzung

10 g enthalten: Wirkstoffe: Bismutum metallicum Trit. D1 0,2 g / Stibium metallicum praeparatum Trit. D1 (HAB, V. 6) 0,2 g.

Cremegrundlage: Gereinigtes Wasser, Dickflüssiges Paraffin, Protegin® WX (Gelbes Vaseline, Ceresin, hydriertes Rizinusöl, Glycerolmonoisostearat, Polyglycerol-3-oleat), Gelbes Vaseline.

Darreichungsform und Packungsgröße

25 g Creme

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Januar 2008