

Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

Flohschutz-Shampoo für Hunde



- Zusammensetzung :** 100 ml Lösung enthalten:
- Wirkstoff: (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat) 0,11 g
- Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Marlopon AT 50, Marlon A 350, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid, Wasserfreie Citronensäure (Ph. Eur.), Macrogol.
- Darreichungsform :** Shampoo
- Zieltierarten :** Hund
- Anwendungsgebiete :** Zur Bekämpfung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.) bei Hunden.


Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

Gegenanzeigen :	Nicht anwenden bei kranken (insbesondere mit mechanischen Verschlüssen der Verdauungs- und Harnorgane, bei Asthma bronchiale oder anderen Lungen- und Kreislaufkrankungen) oder rekonvaleszenten Tieren. Das Tierarzneimittel des weiteren nicht anwenden bei: laktierenden Tieren, hochträchtigen Tieren, Welpen unter 3 Monaten, Tieren mit großflächigen Hautläsionen, Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart :	Keine Angaben.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :	<p><u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:</u></p> <p>Das Tierarzneimittel ist für den äußeren Gebrauch als Insektizid bestimmt. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort gründlich mit Wasser spülen. Behandelte Hunde sollten sich beim Shampooieren und Spülen, bzw. bis das Fell getrocknet ist, nicht ablecken. Achten Sie darauf, dass dem Tier das Tierarzneimittel bei der Anwendung nicht in Nase oder Maul gelangt.</p> <p><u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:</u></p> <p>Behandelte Hunde sollten insbesondere von Kindern nicht angefasst werden, solange das Fell nicht vollständig getrocknet ist. Während der Anwendung direkten Kontakt mit Haut und Augen meiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen und/oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo sollte nicht von schwangeren Frauen im dritten Trimester angewendet werden.</p>
Nebenwirkungen :	Keine bekannt.
Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :	Carbamate können eine Kontraktion der glatten Muskulatur auslösen. Daher sollte Bolfo [®] Flohschutz-Shampoo nicht bei hochträchtigen Tieren angewendet werden. Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, da die

Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml

	<p>Sicherheit des Tierarzneimittels während der Laktation nicht untersucht wurde.</p>
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :	<p>Dem Hund nicht gleichzeitig andere Insektizide verabreichen.</p>
Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :	<p>Zur Anwendung auf dem Fell.</p> <p>Den Hund zuvor gründlich mit lauwarmem Wasser waschen, so dass das Fell richtig nass ist. Das nasse Fell sorgfältig und vorsichtig mit Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo einreiben, wobei Kopf, Hals und Ohren nicht vergessen werden dürfen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Den Schaum etwa 5 Minuten einwirken lassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser ausspülen und das Fell trocken reiben. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort ausspülen.</p> <p>Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo tötet vorhandene Flöhe sofort ab, entfaltet jedoch keine besondere Langzeitwirkung. Durch schlüpfende Flöhe in der Umgebung kann somit ein rascher Neubefall der Tiere stattfinden. Zur Unterstützung der Behandlung wird daher empfohlen, auch das Lager der Tiere, die direkte Umgebung sowie die bevorzugten Aufenthaltsorte der Tiere mit einem geeigneten Insektizid oder Insektenentwicklungshemmer (so genannte "IGRs") zu behandeln. In Abhängigkeit von der Jahreszeit und des Befalldrucks aus der Umgebung, kann eine Nachbehandlung nach 3 bis 7 Tagen notwendig sein.</p> <p>Bei Flohbefall sind alle Tiere in demselben Haushalt mit einem hierfür zugelassenen Insektizid zu behandeln.</p>
Überdosierung :	<p>Sollte das Tierarzneimittel versehentlich verschluckt werden, kann es zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung kommen, wie vermehrter Speichelfluss, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall. In diesen Fällen sofort einen Tierarzt aufsuchen.</p> <p>Gegenmittel: Atropinsulfat.</p>

Bolfo[®] Flohschutz-Shampoo 1,1 mg/ml



Wartezeit :	Nicht zutreffend.
Unverträglichkeiten :	Keine bekannt.
Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :	Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.
Art und Beschaffenheit des Behältnisses :	Weißer Kunststoff-Tube aus HDPE (mit Schraubverschluss aus Polypropylen) mit 100 ml bzw. 250 ml Shampoo. Weiße Kunststoff-Flasche aus HDPE (mit Schraubverschluss aus Polypropylen) mit 250 ml Shampoo. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.
Verschreibungsstatus :	Freiverkäuflich