

Bolfo[®] Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde

Zecken- und Flohschutzband für große Hunde zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken



Zusammensetzung :

Ein Halsband zu 45 g enthält:

Wirkstoff: 4,442 g (2-Isopropoxyphenyl)
(methylcarbamate)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Dibutyladipat, Propylenglycoloctanoatdecanoat, Epoxidiertes Sojabohnenöl, Stearinsäure, Titandioxid, Eisenoxidhydrat, Eisen(III)-oxid, Eisen(II,III)-oxid, Polyvinylchlorid.

Darreichungsform :

Halsband

Zieltierarten :

Hund

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde

Anwendungsgebiete : Zur Bekämpfung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.) und Zecken (*Ixodes ricinus*) bei Hunden. Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab.

In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben.

Wirkungsdauer des Halsbandes gegen Flöhe: bis zu 4 Monate.

Wirkungsdauer des Halsbandes gegen Zecken: bis zu 10 Wochen.

Gegenanzeigen : Nicht anwenden bei kranken (insbesondere mit mechanischen Verschlüssen der Verdauungs- und Harnorgane, bei Asthma bronchiale oder anderen Lungen- und Kreislauferkrankungen) oder rekonvaleszenten Tieren. Das Tierarzneimittel des weiteren nicht anwenden bei: laktierenden Tieren, hochträchtigen Tieren, Welpen unter 3 Monaten, Tieren mit großflächigen Hautläsionen, Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart : Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung : Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Das Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung als Insektizid bestimmt. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist regelmäßig zu kontrollieren.

Bei häufiger und wiederholter Anwendung von Antiparasitika können Parasiten Resistenzen gegen den verwendeten Wirkstoff bzw. der Wirkstoff-Gruppe entwickeln.

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Direkten Hautkontakt vermeiden. Beim Anbringen des Halsbandes Schutzhandschuhe tragen. Beim Umgang mit dem Tier das Halsband so wenig wie möglich anfassen. Nach dem Anfassen die Hände waschen.

Empfindliche Personen sollten den Kontakt mit dem Halsband vermeiden.

Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Das Bolfo® Zecken- und Flohschutzband sollte nicht von schwangeren Frauen im dritten Trimester angewendet werden.

Warnhinweis: Tiere, die ein Bolfo® Zecken- und Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten.

Nebenwirkungen :

Bei sehr empfindlichen Tieren kann es zu Hautirritationen und Juckreiz kommen, besonders in den ersten Tagen nach Anbringen des Bandes. Treten diese Symptome auf, sollte das Band abgenommen werden, bis die Symptome abgeklungen sind. Es ist keine besondere Behandlung notwendig.

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :

Laboruntersuchungen mit verschiedenen Tierarten haben gezeigt, dass während der Trächtigkeit keine Nebenwirkungen zu erwarten sind.

Carbamate können eine Kontraktion der glatten Muskulatur auslösen. Daher sollte Bolfo® Zecken- und Flohschutzband nicht bei hochträchtigen Tieren angewendet werden.

Nicht bei laktierenden Hündinnen anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :

Dem Hund nicht gleichzeitig andere Insektizide oder Akarizide verabreichen.

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :

Halsband zum Befestigen am Hals.

Ein Halsband pro Tier.

Das Halsband aus der versiegelten Schutzpackung nehmen, entrollen und die Plastikreste von der Innenseite des Halsbandes entfernen. Das Halsband locker um den Hals des Tieres legen und, falls nötig, das überstehende Ende abschneiden. Das Band darf nicht zu eng sitzen (zwei Finger Abstand zwischen Band und Hals werden empfohlen). In den ersten Tagen nach dem Anlegen sollte die Haut im Halsbereich überprüft werden, da nicht jedes Tier den Auflagedruck eines Halsbandes verträgt. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist regelmäßig zu kontrollieren.

Die Dauer der Schutzwirkung ist abhängig von der Länge und dem Pflegezustand des Fells, von der Aktivität des Tieres sowie vom Parasitenbefall. Um bei Tieren mit struppigem, verfilztem oder verfettetem Haarkleid eine optimale Schutzwirkung zu erzielen, sollten diese Tiere vor dem Anlegen des Halsbandes shampooiert werden. Lässt die Wirkung nach, ein neues Halsband anlegen.

Die Fellpflege kann wie gewohnt fortgesetzt werden. Vor dem Baden ist dem Tier das Halsband abzunehmen und erst wieder anzulegen, wenn das Tier trocken ist. Wird das Tier häufig sehr nass (Regen, Schwimmen, Baden), kann dadurch die Wirksamkeit des Halsbandes vermindert werden.

Bei Flohbefall sind alle Tiere in demselben Haushalt mit einem hierfür zugelassenen Insektizid zu behandeln.

Hinweis für die Anwendung:

Außer den Flöhen auf dem Hund können sich in der Umgebung auch Floheier, -larven und -puppen befinden. Diese wachsen nach einiger Zeit zu neuen Flöhen heran. Zur Unterstützung der Behandlung wird daher empfohlen, auch das Lager der Tiere, die direkte Umgebung sowie die bevorzugten Aufenthaltsorte der Tiere mit einem geeigneten Insektizid oder

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde

Insektenentwicklungshemmer (so genannte "IGRs") zu behandeln.

Überdosierung :

Die Gefahr der Überdosierung besteht aufgrund der Beschaffenheit des Medikamentes nicht. Sollte das Produkt versehentlich verschluckt werden, kann es zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung kommen, wie vermehrter Speichelfluss, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall. In diesen Fällen sofort einen Tierarzt aufsuchen.

Gegenmittel: Atropinsulfat.

Wartezeit :

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Unverträglichkeiten :

Keine bekannt.

Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Art und Beschaffenheit des Behältnisses :

Verbundverpackung aus Polyester/Polyethylen in einer Faltschachtel aus Pappe mit einem Halsband zu 45 g.

Verschreibungsstatus :

Freiverkäuflich

