

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Broncho-orthim®

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege, Bronchitis, Keuchhusten. Hinweis: Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten, bei Atemnot, bei Fieber, bei eitrigem oder blutigem Auswurf empfehlen wir die Rücksprache mit einem Arzt.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Broncho-orthim nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Jodüberempfindlichkeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Broncho-orthim in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung mit Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel und wie oft sollten Sie Broncho-orthim anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

bitte wenden!

Folgen von Überdosierung, unterlassener Einnahme, abruptem Absetzen:

Keine. Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Broncho-orthim soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden! Das Verfalldatum befindet sich auf der Verpackung bzw. auf dem Gefäßetikett.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,25 mg Atropa belladonna Trit. D1, 2,5 mg Cephaelis ipecacuanha Trit. D2, 25 mg Drosera Trit. D1, 25 mg Euspongia officinalis (Spongia) Trit. D2. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Darreichungsform und Inhalt:

Packung zu 100 Tabletten zum Einnehmen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25°C aufbewahren!

Zul.- Nr. 23216.00.00

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

Orthim KG, Otto-Hahn-Straße 17-19, 33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: 05245/92 010-0, Fax: 05245/92 010-66

E-Mail: info@orthim.com, www.orthim.com



Stand der Information: Oktober 2010