


# Cervitec® Gel

## The oral health care gel



### English

#### Cervitec® Gel – The oral health care gel

##### Application:

Depending on your needs, you may apply Cervitec Gel

- directly on the gums, oral mucous membranes, on the tongue and teeth or the inner aspects of removable dentures.
- on the interdental brush to clean the space between teeth or fixed restorations – for example bridges or implants.
- or use it to brush your teeth. Continue to brush once a day with your usual toothpaste.
- to your tray and wear it once or twice a day for 5 to 10 minutes. This procedure is recommended for a duration of 2 to 14 days every 3 to 4 months.

##### Duration:

- Even when used for more than four weeks, no staining of teeth or problems with the sense of taste are to be expected.

##### Tip:

Do not rinse after use! This supports the care effect of Cervitec Gel.

### Deutsch

#### Cervitec® Gel – Das Mundpflege Gel

##### Anwendung:

Sie können Cervitec Gel entsprechend Ihrer Bedürfnisse anwenden:

- direkt auf Zahnfleisch, Mundschleimhaut, Zunge und Zähne oder Innenseite des herausnehmbaren Zahnersatzes antragen.
- auf die Interdentalbürste aufbringen. Zwischenräume bei Zähnen oder festzusetzenden Zahnersatzes z.B. Brücken oder Implantate – damit reinigen.
- zum Zahnpflegen verwenden. Weiterhin 1x täglich mit der gewohnten Zahnpasta putzen.
- in Ihre Schiene füllen und 1-2 mal täglich für 5-10 Minuten einwirken lassen. Dies empfiehlt sich für 2-14 Tage alle 3-4 Monate.

##### Dauer:

- Auch bei Anwendung von mehr als 4 Wochen sind keine Verfärbungen der Zähne oder Geschmacksirritationen zu erwarten.

##### Tipp:

Bitte nach der Anwendung nicht ausspülen! Damit unterstützen Sie die pflegende Wirkung von Cervitec Gel.



### Español

#### Cervitec® Gel – Gel para el cuidado oral

##### Aplicación:

Dependiendo de sus necesidades, Usted puede aplicar Cervitec Gel

- Directamente en las encías, membranas mucosas, en la lengua y dientes o en la parte interior de las dentaduras removibles.
- En cepillos interdentales para limpiar el espacio entre dientes o restauraciones fijas – por ejemplo puentes o implantes.
- O utilizar para cepillar los dientes. Continue con el cepillado una vez al día con su pasta de dientes habitual.
- O en su férula y llevarla una o dos veces al día de 5 a 10 minutos. Este procedimiento es recomendado en una duración de 2 a 14 días cada 3 o 4 meses.

##### Duración:

- Incluso si se utiliza más de cuatro semanas, no se esperan tinciones en los dientes o problemas con el sentido del gusto

##### Aviso:

No enjuagarse después de su uso. Este hecho respalda el efecto de cuidado de Cervitec Gel.

### Français

#### Cervitec® Gel – Gel pour l'hygiène buccodentaire

##### Application :

Selon vos besoins, le Gel Cervitec peut :

- être appliquée directement sur la gencive, la muqueuse bucale, la langue et les dents ou l'intrados de votre prothèse amovible
- être étalé sur la brosse interdentaire. Nettoyer les espaces interdentaires des dents ou de la prothèse fixe – par ex. bridges ou implants -
- être utilisé pour le brossage des dents, en plus du brossage avec le dentifrice habituel.
- être déposé dans votre gouttière thermoformée, à porter 1 à 2 fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Cette procédure est recommandée pour une durée de 2 à 14 jours, à renouveler tous les 3 ou 4 mois.

##### Durée :

- même en cas d'application supérieure à 4 semaines, aucune décoloration des dents ni altération du goût n'est à constater

##### Conseil :

Ne pas rincer après l'application ! L'effet de traitement du gel Cervitec se trouve ainsi renforcé.

### Italiano

#### Cervitec® Gel – Il gel per l'igiene orale

##### Utilizzo:

Secondo necessità, Cervitec Gel può essere applicato:

- direttamente sulle gengive, sulle mucose orali, sulla lingua e sui denti o sul lato interno della protesi dentale rimovibile;
- sullo scovolino interdentale ed utilizzato quindi per pulire gli spazi interdentali di denti o protesi dentale fissa – p.es. ponti o impianti.
- sullo spazzolino per la pulizia dentale. Continuare ad usare il solito dentifricio una volta al giorno.
- sulla protesi mobile e lasciare agire quotidianamente per 5-10 minuti. Si consiglia questo trattamento per 2-14 giorni ogni 3-4 mesi.

##### Durata:

- Anche nel caso di utilizzo per un periodo superiore a 4 settimane non si riscontrano decolorazioni dei denti o alterazioni del senso del gusto.

##### Consiglio:

Non sciaccquare dopo l'applicazione! In tal modo si rafforza l'effetto terapeutico di Cervitec Gel.

### Svenska

#### Cervitec® Gel – den munvårdande gelen

##### Användning:

Beroende på dina behov kan du använda Cervitec Gel:

- direkt på tandkött, munslémhinnor, på tungan och tänderna eller insidan av uttagbara proteser.
- på interdentalborsten. Rengör mellanrummet mellan tänder eller fasta tandersättningar, t.ex. broar eller implantat, med gelen.
- för att borsta tänderna. Borsta dock 1 gång dagligen med din vanliga tandkräm.
- genom att fylla din sked och använda den en eller två ggr/dag under 5-10 minuter. Vi rekommenderar detta förståndare under 2-14 dagar var 3:e - 4:e månad.

##### Behandlingslängd:

- Åven om gelen används i mer än 4 veckor förväntas ingen missfärgning av tänderna eller nedsatt smaksinne.

##### Tips:

Skölj inte tänderna efter användning! På så sätt bevaras den vårdande effekten av Cervitec Gel.

### Norsk

#### Cervitec® Gel – gel for munhygiene

##### Bruk:

Alt etter behov kan du bruke Cervitec Gel

- direkte på tannkjøtt, slimmhinner i munnen, tenner, tungen eller innsideen av uttakbar tanntprostese.
- på interdentalborsten. Du kan da rengjøre mellomrommene mellom tennene eller stasjonær tanntprostese, f.eks. broer eller implantater, med den.

- til tannpuss. Du må da fortsatt pusse tennene en gang om dagen med vanlig tannpasta.
- på platen, og bruke den én eller to ganger per dag i 5 til 10 minutter. Dette er en anbefalt prosedyre i en periode på 2 til 14 dager hver 3. eller 4. måned.

##### Varighet:

Det forventes ikke fargeforandringer på tennene eller smaksirritasjoner selv ved bruk i mer enn 4 uker.

##### Tips:

Skyll ikke munnen etter bruk! Da støtter du opp om den pleiende virkningen til Cervitec Gel.

### Nederlands

#### Cervitec® Gel – De mondverzorgingsgel

##### Toepassing:

U kunt Cervitec Gel op de volgende manieren gebruiken:

- Breng de gel direct aan op uw tandvlees, uw mond-slijmvlies, uw tong, op uw gebit of aan de binnenkant van uw uitneembare prothese.
- Breng de gel aan op een interdental borstel. Reinig met de borstel de tussenruimten van uw gebit of van uw vaste prothetische voorziening, bijvoorbeeld een brug of implantaten.
- Gebruik de gel voor het poetsen van uw tanden. Blif wel eenmaal daags poetsen met uw gebruikelijke tandpasta.
- Doe de gel in uw spalk en laat hem 1 à 2 keer per dag gedurende 5 à 10 minuten inwerken.

Herhaal deze behandeling 2 à 14 dagen, om de 3 à 4 maanden.

##### Tijdsduur:

- Ook wanneer het middel meer dan 4 weken wordt gebruikt verkleurt het gebit niet en treden er geen smaakafwijkingen op.

##### Tip:

Speel de gel na gebruik niet weg met water! U ondersteunt zo het verzorgende effect van Cervitec Gel.

### Suomi

#### Cervitec® Gel – suunhoitoon

##### Käyttö:

Cervitec Gel voit tarpeidesi mukaan

- levittää suoraan ikeneen, suun limakalville, kielelle, hampaisiin tai irrotettavien hammasharjoitteen sisäpuolelle.
- levittää hammasharjoitajalle sekä käytää puuhdistamalla hampaiden tai kiinteän hammasharjoitteen (esim. silta tai implantti) välejä.
- käytää hampaiden puuhdistukseen. Puuhista hampaat kuitenkin edelleen kerran päivässä tavallisella hammastahnaalla.
- laittaa lisukaaaksi, jota pitää suussa kerran tai kahdesti päivässä 5 - 10 minuutin ajan; hoitosuositus tällä menetelmällä on 2 - 14 py 3 - 4 kuukauden välein.

### Kesto:

- Myös yli 4 viikkoja jatkuneessa käytössä ei ole odottettavissa hampaiden värijäytyistä tai makuaistista ärsyistä.

##### Vinkki:

Älä huuhtele käytön jälkeen! Se tukee Cervitec Gel hoitavaa vaikutusta.

## Ελληνικά

### Cervitec® Gel – Το ζελ στοματικής φροντίδας

#### Εφαρμογή:

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορείτε να χρησιμοποιήστε το ζελ Cervitec

- τοποθετώντας το απευθείας στα ούλα, στο στοματικό βλεννογόνο, στη γλώσσα και στα δόντια ή στην εσωτερική πλευρά του φαιρούμενου δοντοκύτου υποκατάστατου.
- τοποθετώντας το επάνω στη μεσοδόντια βούρτσα για τον καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων ή σταθερών οδοντικών υποκατάστατων – π.χ. γεφυρών ή εμφυτευμάτων.
- για δοντοκύτους καθαρισμούς. Απαιτείται επιπλέον καθαρισμός μια φορά την ημέρα με τη συνθημένη δοντοπάστα.
- στο δοντάρι σας και να το φοράτε μία ή δύο φορές την ημέρα για 5 έως 10 λεπτά. Αυτή η διαδικασία συνιστάται για χρονική διάρκεια από 2 έως 14 ημέρες κάθε 3 έως 4 μήνες.

#### Διάρκεια:

- Ακόμη και σε περίπτωση χρήσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων δεν αναιμένονται αποχρωματισμοί των δοντιών ή ενοχλήσεις στη γεύση.

**Συμβουλή:**  
Μην ξεπλένετε μετά την εφαρμογή! Με τον τρόπο αυτό ενισχύετε την περιποιητική δράση του ζελ Cervitec.

## Türkçe

### Cervitec® Gel – Ağız Bakım Jeli

#### Kullanım:

- Cervitec Gel'i ihtiyaclarınızda kullanın:
- Dogrulanmış dişeti, ağız muukozi, dil ve dişler veya hareketli diş protezlerinin iç kısımına sürebilirsiniz.
  - İnterdental fırça üzerinde sıkılsınız. Bu fırçayla dişlerin veya sabit diş protezi (örm, köprü veya implantlar) arasındaki boşlukları temizleyebilirsiniz.
  - Dişlerinizi fırçalarken kullanabilirsiniz. Ayrıca normalde kullanılan diş macunuyla da günde bir kez fırçalamanızdır.
  - Dental splintinizin üzerinde sıkılsınız. Onu günde bir ya da iki kez 5-10 dakikalığında takarak etki ettiirebilirsiniz. Bu işlemen her üç - dört ayda bir, 2 ila 14 gün arasında bir süreyle yapılması tavsiye edilmektedir.

#### Kullanım süresi:

- 4 haftadan uzun kullanımlarda bile dişlerde renk değişimi veya tad alma duygusunda bozukluk beklenmemektedir.

#### Öneri:

Lütfen uyguladıktan sonra ağızınızı suyla çalkalamağın. Bu sayede Cervitec Gel'in bakım etkisi güçlenir.

## Slovensko

### Cervitec® Gel – gel za nego ustne votline

#### Uporaba:

Cervitec Gel lahko glede na potrebe:

- nanese nedopredno na dlesni, ustno sluznico, jekiz in zobe ali notranji del snemljive zobne proteze.
- nanese na medzobno ščetko za čiščenje medzobnega prostora ali prostora med restavracijami, na primer mostički ali vsadki
- uporabljajte za ščetkanje zob. Enkrat na dan zobe še naprej ščetkajte s svojo običajno zobno pasto.
- nanese na nastavek, ki ga nosite enkrat ali dvakrat na dan 5 do 10 minut. Připrocoamo, da postopek ponovite vsake 3 do 4 mesece za 2 do 14 dni.

#### Tranje:

- Tudi če uporabljate dlje kot štiri tedne, se ne pričakujete težave z obarvanjem zob ali občutkom za okus.

#### Nasvet:

Po uporabi ne splahnite! S tem okrepite negovalni učinek gela Cervitec Gel.

## Hrvatski

### Cervitec® Gel - gel za oralnu njegu

#### Primjena:

Ovisno o Vašim potrebama, možete Cervitec Gel

- nanjeti direktno na desni, oralnu sluznicu, jekiz i zube ili na unutarnju stranu mobilnih protetiskih radova.
- nanjeti na interdentalni četkicu. Time čistiti prostor između zuba ili fiksnih nadomjestaka - npr. mostove ili implantate.
- koristiti za četkanje zuba. Četkati i dalje jedanput dnevno uobičajenom pastom za zube.
- staviti u Vašu ukladigu i pustiti da djeluje jednom do dva puta dnevno od 5 do 10 minuta. Ovaj postupak se preporuča tijekom za 2 do 14 dana svaka 3 do 4 mjeseca.

#### Tranje:

- Čak i kada se koristi dulje od četiri tjedna, ne treba očekivati promjenu boje na zubima ili smetnje okusa.

#### Savjet:

Molimo, nemojte isprati nakon uporabe! Na taj način posjećujete učinak njego gelom Cervitec Gel.

## Český

### Cervitec® Gel – gel pro péci o zdraví ústní dutiny

#### Použití:

Podle svých potřeb můžete přípravek Cervitec Gel

- nanášet přímo na dásně, sliznice ústní dutiny, jazyk a zuby nebo na vnitřní části odstranitelného umělého chrupu.
- nanášet na mezižubní kartáček pro čištění prostoru mezi zoubky nebo fixními výplními - například můstky či implantáty.

## zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

## Polski

### Cervitec® Gel – żel do higieny jamy ustnej

#### Sposób stosowania

W zależności od wskazań, Cervitec Gel można stosować:

- bezpośrednio na powierzchnię dziąsła, blony ślużowej jamy ustnej, języka, zębów oraz na wewnętrzna powierzchnię ruchomych uzupełnień protetycznych,
- na szczoteczkę międzyżebową w celu oczyszczenia przestrzeni międzyżebowych lub brzegów stałych uzupełnień protetycznych, jak np. mosty, wszczepy,
- na szczoteczkę do mycia zębów, (jeden raz dziennie zamiast pasty do mycia zębów),
- na szynę nakładkową 1 – 2 razy dziennie przez 5-10 minut. Zalecaný czas kuracj, to 2-14 dni, co 3-4 miesiące.

#### Czas stosowania żelu:

- Nawet po upływie 4 tygodni użytkowania nie obserwowano przebarwień ani zaburzeń smaku.

#### Wskazówka:

Nie plukaj żelu ustnej po zastosowaniu żelu!  
Działanie żelu jest wtedy bardziej intensywne.

## Русский

### Cervitec® Gel – гель для ухода за полностью рта

#### Применение:

В зависимости от необходимости, Вы можете наносить Cervitec Gel:

- непосредственно на десны, слизистую оболочку полости рта, языка и зубы или на внутреннюю поверхность съемных зубных протезов.
- на межзубной щетички для чистки пространства между зубами или несъемными зубными протезами – например, при наличии мостовидных зубных протезов или имплантатов.
- или использовать гель для чистки зубов. Продолжая чистить их раз в день с обычной зубной пастой.
- на каппу и носить ее раз или два в день от 5 до 10 минут. Рекомендуется проводить эту процедуру от 2 до 14 дней каждые 3-4 месяца.

#### Сроки применения:

- Даже при использовании более четырех недель не возникает окрашивания зубов или изменения вкусовых ощущений.

#### Примечание:

Не смывать после нанесения! Это продлевает эффект Cervitec Gel.

Date information prepared: 09/2010; Rev. 1  
616559/0910/WE3/OE1/G

[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,  
FL-9494 Schaan, Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35, Fax +423 235 33 60

ivoclar  
vivadent:  
clinical