



## HALSTABLETTEN

### **Liebe Patientin, lieber Patient!**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Gebrauchsanweisung Citramin® Halstabletten**

#### **Was ist in Citramin® Halstabletten enthalten?**

1 Lutschtablette enthält 1 mg Aluminiumkaliumsulfat 12 H<sub>2</sub>O.

*Sonstige Bestandteile:* Sorbitol, wasserfreie Citronensäure, Magnesiumstearat, Farbstoff E 104, Aromastoff.

1 Tablette enthält 0,677 g Zuckeraustauschstoff Sorbitol, entspr. 0,056 BE.

#### **Wann werden Citramin® Halstabletten angewendet?**

Die Lutschtabletten eignen sich zur Anwendung bei leichten Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut sowie bei Aphthen (punktförmige Entzündungen).

Durch seine zusammenziehende und verfestigende Wirkung auf Eiweißstoffe bewirkt der Inhaltsstoff Alaun, dass schädliche Stoff-

wechselprodukte der Schleimhaut abgestoßen werden.

Gleichzeitig wird der Nährboden für Krankheitserreger entfernt und die Wundheilung gefördert.

#### **Wann dürfen Citramin® Halstabletten nicht angewendet werden?**

Citramin® Halstabletten dürfen nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe.

Bei Fructoseunverträglichkeit soll die Behandlung nur nach Rücksprache mit dem Arzt durchgeführt werden; dies gilt auch für Patienten mit Morbus Alzheimer und Parkinsonsyndrom sowie für dialysepflichtige Personen.

#### **Wann ist bei der Anwendung von Citramin® Halstabletten Vorsicht geboten?**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Maßnahmen zu beachten.

#### **Dürfen Citramin® Halstabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?**

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Daher sollte die Anwendung von Citramin® Halstabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.



## HALSTABLETTEN

### Wie wenden Sie Citramin® Halstabletten an?

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren lutschen bis zu 8mal täglich 1 Tablette. Kinder unter 4 Jahren sollten Citramin® Halstabletten nicht anwenden, um ein eventuelles Verschlucken zu vermeiden.

#### Hinweis für Diabetiker:

1 Tablette enthält 0,677 g Sorbitol (Zuckeraustauschstoff) = 0,056 BE.

### Wie lange dürfen Sie Citramin® Halstabletten anwenden?

Sind die Beschwerden nach 3-tägiger Anwendung von Citramin® Halstabletten nicht weitgehend abgeklungen, so sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Welche unerwünschten Nebenwirkungen können Citramin® Halstabletten haben?

Sehr selten kann bei der Anwendung des Präparates aufgrund des Sorbitolgehaltes eine abführende Wirkung auftreten.

### Was ist ferner zu beachten?

Durch den enthaltenen Farbstoff kann es zu einer vorübergehenden oberflächlichen Gelbfärbung der Zunge kommen.

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

### Erläuterungen für den

#### Blister:

EXP = Verfallsdatum,  
LOT = Chargen-Bezeichnung.  
Die Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25° C zu lagern.

### Welche Packungen sind erhältlich?

Packungen mit 30 Lutschtabletten.

### Hersteller

Engelhard Arzneimittel  
GmbH & Co. KG  
Herzbergstr. 3  
61138 Niederdorfelden  
Telefon: 0 61 01/5 39-3 00  
Telefax: 0 61 01/5 39-3 15

### Internet:


<http://www.engelhard-am.de>

### E-Mail:

[info@engelhard-am.de](mailto:info@engelhard-am.de)

### Stand der Information:

Mai 2012

 Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

