

# Droncit® Spot-on 40 mg/ml

## Bandwurmmittel für Katzen



**Zusammensetzung :**

1 Pipette mit 0,5 ml Lösung enthält:

Wirkstoff: 20,0 mg Praziquantel.

Sonstige Bestandteile deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: 0,5 mg Butylhydroxytoluol.

**Darreichungsform :**

Lösung zum Auftropfen auf die Haut. Klare gelblich-bräunliche Lösung.

**Zieltierarten :**

Katze

**Anwendungsgebiete :**

Zur Behandlung von Bandwurminfektionen der Katze.

Bandwurmmittel gegen reife und unreife Darmstadien von *Dipylidium caninum* und *Taenia (Hydatigera) taeniaeformis*.

# Droncit<sup>®</sup> Spot-on 40 mg/ml

**Gegenanzeigen :** Katzen unter 1 kg Körpergewicht (KGW), da die Pipette keine Dosierung für Katzen unter 1 kg KGW vorsieht.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart :** Resistenz der Parasiten gegen eine spezielle Klasse von Antiparasitika kann durch häufige und wiederholte Verabreichung von Antiparasitika dieser Klasse entstehen.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :** Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Droncit<sup>®</sup> Spot-on kann augenreizend sein, wenn es zum direkten Kontakt mit den Augen kommt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Nach der Anwendung sind die Hände gründlich zu waschen. Mit Droncit<sup>®</sup> Spot-on in Berührung gekommene Körperstellen mit Wasser und Seife reinigen.

Da Droncit<sup>®</sup> Spot-on zur Augenreizung führen kann, ist der Kontakt des Präparates mit den Augen des Anwenders oder des zu behandelnden Tieres strikt zu vermeiden. Sollte es doch zum Kontakt der Augen des Anwenders oder des zu behandelnden Tieres mit dem Präparat kommen, die Augen sofort mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Haut- oder Augenirritationen sollte um ärztlichen Rat gefragt werden.

Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen:

Das Lösungsmittel in Droncit Spot-on kann verschiedene Materialien, z.B. auch Kunststoffe, Leder oder Stoffe angreifen. Kontakt des Produktes oder der noch feuchten Auftragstelle(n) mit solchen Materialien vermeiden.

# Droncit<sup>®</sup> Spot-on 40 mg/ml

**Nebenwirkungen :** In seltenen Fällen können nach der Behandlung an der Auftragsstelle lokale Hautreaktionen auftreten. Gelegentlich kann Droncit<sup>®</sup> Spot-on wegen des bitteren Geschmacks Speicheln verursachen, wenn die Katze unmittelbar nach der Behandlung die Auftragsstelle leckt. Dies ist kein Hinweis auf eine Vergiftung und klingt ohne Behandlung nach kurzer Zeit ab.

**Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :** Droncit<sup>®</sup> Spot-on kann trächtigen Katzen gegeben werden. Praziquantel gilt als sicher sowohl für das weibliche Tier selber als auch für den Fötus sowie die neugeborenen Jungen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :** Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :** Zur Anwendung auf der Haut.

Die Behandlung mit Droncit<sup>®</sup> Spot-on erfordert eine Mindestdosis von 8 mg Praziquantel pro kg Körpergewicht (KGW) und erfolgt nach folgendem Dosierungsschema:

<b>Körpergewicht</b>	<b>Anzahl der Pipetten</b>
1 - 2,5 kg	1
> 2,5 - 5 kg	2
> 5 - 7,5 kg	3

Die Verabreichung der Lösung erfolgt mit der Pipette, die eine einfache und sichere Verabreichung von Droncit<sup>®</sup> Spot-on ermöglicht.

Die Pipette aus der Packung entnehmen und in einer aufrechten Position halten. Die kindergesicherte Verschlusskappe abziehen, umgekehrt auf die Pipette aufdrücken und unter Drehen wieder abziehen.

## Droncit<sup>®</sup> Spot-on 40 mg/ml



Droncit<sup>®</sup> Spot-on soll im Nacken aufgetragen werden, so dass die Katze die Lösung nicht ablecken kann. Mit zwei Fingern das Fell im Nacken soweit auseinanderteilen, bis die Haut sichtbar wird. Droncit Spot-on durch mehrmaliges Ausdrücken der Pipette direkt auf die Haut auftragen; die Pipette dabei senkrecht nach unten halten.



Die Anwendung erfolgt einmalig.

### **Überdosierung :**

Überdosierung kann zu leichten lokalen Hautreaktionen führen, die innerhalb einiger Tage ohne Behandlung verschwinden.

### **Wartezeit :**

Entfällt

### **Unverträglichkeiten :**

Keine bekannt.

### **Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses :**

Nach dem Öffnen der Pipette ist der gesamte Inhalt auf die Haut des Tieres aufzutropfen.

## Droncit<sup>®</sup> Spot-on 40 mg/ml



<b>Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :</b>	Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt aufbewahren.
<b>Art und Beschaffenheit des Behältnisses :</b>	Faltschachtel mit 4 Pipetten mit jeweils 0,5 ml Lösung. Pipette aus weißem Polypropylen. Verschlusskappe aus weißem Polypropylen.
<b>Verschreibungsstatus :</b>	Apothekenpflichtig

