

Vor der ersten Einnahme von euviril® direct sorgfältig durchlesen!

euviril® direct ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von erektiler Dysfunktion.

Zusammensetzung

	je Brausetablette	pro 100 g
Aminosäuren		
L-Arginin HCL	2000 mg	49 g

Verzehrempfehlung

Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Erwachsene 3 Brausetabletten in 200 ml Wasser gelöst ein.

Bei gleichzeitiger Einnahme von euviril® complex, sind 1 – 2 Brausetabletten ausreichend.

Wichtige Hinweise

- euviril® direct Brausetabletten sind ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)!
- euviril® direct ist kein vollständiges Lebensmittel!
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
- Außer Reichweite von Kindern lagern!
- Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen!

Lieber Verwender!

Mit euviril® direct von SanimaMed haben Sie sich für ein hochwertiges, gut verträgliches diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke entschieden. euviril® direct enthält die Aminosäure L-Arginin, die in dieser Dosierung zur diätetischen Behandlung von erektiler Dysfunktion (Erektionsstörungen) geeignet ist.

L-Arginin bei erektiler Dysfunktion

Die gezielte Ergänzung der Ernährung mit L-Arginin kann die Stickstoffmonoxid-Bildung verstärken und damit eine Verbesserung der Erektionsfähigkeit bewirken.

L-Arginin gehört zu den 20 Aminosäuren, die unter anderem am Aufbau der Proteine beteiligt sind. Da die Aminosäure auch das Substrat für die körpereigene Synthese von Stickstoffmonoxid ist, wird sie

als so genannter „NO-Donator“ bezeichnet. Für diese Entdeckung erhielten Furchgott, Murad und Ignarro 1998 den Medizin-Nobelpreis.

Verträglichkeit

euviril® direct ist gut verträglich.

Weitere Gesundheitstipps

Bestimmte Faktoren können das Risiko für Gefäßverengungen und erektile Dysfunktion erhöhen:

- Diabetes mellitus
- Bewegungsarmut
- Bluthochdruck
- Stress
- Fettstoffwechselstörungen
- Fettreiche Ernährung
- Übergewicht

Bei ernährungsbedingten Gefäßveränderungen und erektiler Dysfunktion sollten folgende Regeln unbedingt beachtet werden

- Ernähren Sie sich ausgewogen und möglichst kalorienreduziert.
- Vermeiden Sie regelmäßigen Tabak- und Alkoholkonsum, insbesondere Bier und so genannte harte Getränke.
- Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft und treiben Sie zusätzlich Sport.
- Essen Sie möglichst viel frisches Gemüse und meiden Sie fett- und kohlenhydratreiche Nahrungsmittel.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten.

Wie sollte euviril® direct aufbewahrt werden?

euviril® direct Brausetabletten müssen an einem trockenen und kühlen Ort (nicht über 25°C) aufbewahrt werden. Brausetabletten erst kurz vor der Einnahme entnehmen.

euviril® direct – garantierte Qualität für Ihre Gesundheit

Alle Inhaltsstoffe von euviril® direct sind von höchster Qualität. Sie werden laufend strengsten Kontrollen unterzogen und auf Identität, Reinheit sowie Gehalt überprüft.

Weitere Produkte von euviril®:



Geeignet zur Dauereinnahme

euviril® complex

Für die diätetische Langzeitbehandlung von erektiler Dysfunktion und Gefäßverengungen.
120 Kapseln · PZN 2497424



Unsere Empfehlung zum Start

euviril® combipack

Unser Therapiekonzept.
Kombinations-Packung mit 120 Kapseln euviril® complex und 15 Brausetabletten euviril® direct.
PZN 6715929



Die 6-Wochen-Kur für Blase und Prostata

euviril® aprosta

Zur diätetischen Behandlung von erhöhtem Harndrang bei gutartiger Prostatavergrößerung.
90 Kapseln · PZN 6109962

SanimaMed Europe Health S.r.l.
Postfach 17 03 76
53029 Bonn
www.sanimamed.com

SanimaMed