

Sanum

Formasan Mischung flüssiger Verdünnungen zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum formicicum
Zusammensetzung:	2 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: 0,50 ml Acidum formicicum Dil. D6 0,50 ml Acidum formicicum Dil. D12 0,50 ml Acidum formicicum Dil. D30 0,50 ml Acidum formicicum Dil. D200
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1-2 mal wöchentlich 1 Ampulle zu 2 ml s.c. oder i.m. injizieren. Nach Anbruch Rest verwerfen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine

ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 10/50 Ampullen à 2 ml, Bündelpackung 10x 50 Ampullen à 2 ml.

Stand vom: 002