

## **Gebrauchsinformation, bitte aufmerksam lesen!**

### **FORMISOTON® D4**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Wirkstoff: Acidum formicicum D4

#### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.

Dazu gehören Rheumatismus der Muskeln und Gelenke;

zur Initialbehandlung (siehe Schema unter Dosierungsanleitung).

#### **Hinweis:**

Bei anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden, sowie bei akuten Gelenkbeschwerden, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie FORMISOTON® D4 nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Ameisensäure.

FORMISOTON® D4 sollte nicht bei Patienten im akuten Gichtanfall eingesetzt werden, da die Symptomatik sich auf andere, bisher nur latent erkrankte Gelenke ausdehnen könnte.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte FORMISOTON® D4 in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Täglich bis mehrtägig 1 Ampulle subcutan injizieren; bei kleineren Gelenken, wie z.B. beim Kiefergelenk (Costen-Syndrom), eine halbe Ampulle subcutan.

Bei Arthrosen hat sich folgendes Schema bewährt:

	1. Woche	2. Woche	ab der 3. Woche
<b>FORMISOTON® D4</b>	Täglich	2-tägig	---
<b>FORMISOTON® D6</b>	---	---	1-2 mal wöchentlich

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Überdosierung und andere Anwendungsfehler:**

Wenn Sie eine größere Menge FORMISOTON® D4 angewendet haben, als Sie sollten, sind in der Regel keine nachteiligen Folgen zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von FORMISOTON® D4 vergessen haben, holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Wenden Sie aber nicht die doppelte Dosis an.

Wenn Sie die Anwendung von FORMISOTON® D4 abbrechen, können sich Ihre Beschwerden wieder verschlimmern oder erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.



Staufen-Pharma GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 33 - 35 + 40  
73033 Göppingen

**Stand der Information:**  
September 2014

VNr.: 2014 10AO