

# Sanum

## Fortakehl® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 aquos. (HAB, Vorschrift 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2x wöchentlich 1 Ampulle zu 1 ml s.c. injizieren.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Fortakehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium roquefortii ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei &#8226; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium roquefortii). &#8226; Autoimmunerkrankungen &#8226; Kindern unter 12 Jahren &#8226; Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	

---

Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Fortakehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Zusatzhinweis:	Penicillium roquefortii ist als Wirkstoff auch in Exmykehl® enthalten.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	1/10/50 Ampullen à 1 ml.
Stand vom:	001

---