

# GASTRITIS-HEVERT COMPLEX

## Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Magenschleimhautentzündungen.

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Gastritis-Hevert Complex nicht einnehmen?

Aufgrund des Bestandteils Stibium sulfuraturnigrum nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.

Aufgrund der Bestandteile Stibium sulfuraturnigrum und Bismutum subnitricum nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

#### Kinder

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund des Bestandteils Stibium sulfuraturnigrum nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Wie bei allen Arzneimitteln kann die Wirkung durch allgemeine schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für homöopathische Arzneimittel. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

### Wichtige Informationen zu bestimmten sonstigen Bestandteilen

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Lactoseunverträglichkeit leiden.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet: 1-3-mal täglich 1 Tablette einnehmen.

#### Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise zu Haltbarkeit und Aufbewahrung

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des vor dem Behältnis und Umkarton angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C lagern!

Arzneimittel: Stets vor Kindern geschützt aufbewahren!

### Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Abies nigra Trit. D4 31,25 mg

Absinthium Trit. D4 31,25 mg

Stibium sulfuraturnigrum Trit. D4 31,25 mg

Belladonna Trit. D3 25,00 mg

(HAB, Vorschrift 2a;

D1 mit Ethanol 30% (m/m),

D2 mit Ethanol 15% (m/m))

Bismutum subnitricum Trit. D2 31,25 mg

Carbo vegetabilis Trit. D3 31,25 mg

Hepar sulfuris Trit. D6 31,25 mg

Magnesium carbonicum Trit. D2 31,25 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke.

### Darreichungsform und Packungsgrößen

40/100 Tabletten zum Einnehmen.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

In der Weiherwiese 1

D-55569 Nussbaum

www.hevert.de

### Stand der Information

Januar 2012

Zul.-Nr. 6888273.00.00