

schülke -†



Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung sowie vor Blutentnahmen und Injektionen.

kodan® Tinktur forte

Unser Plus:

- breites antiseptisches Wirkungsspektrum
- schneller Wirkungseintritt (15 Sek. vor Injektion)
- gute Inzisionsfolienhaftung nach Abtrocknung
- sehr gute Hautverträglichkeit
- VAH/DGHM-gelistet

Anwendungsgebiete

- zur Hautantiseptik vor operativen Eingriffen, vor Injektionen und Blutentnahmen, vor Punktionen sowie vor Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien
- zur Wund- und Nahtversorgung
- zur hygienischen Händedesinfektion (nur kodan® Tinktur forte farblos)
- zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Prophylaxe von Hautpilzkrankungen

Anwendungsmethoden / -hinweise

Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Exzisionen etc.:

Betreffende Hautstelle mit kodan® Tinktur forte besprühen oder mit einem getränkten Tupfer abreiben und Einwirkzeit beachten. Bei Verwendung von kodan® Tinktur forte vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut antrocknen lassen, um eine eventuelle Beeinträchtigung zu vermeiden.

Vor Gelenkpunktionen und präoperativer Hautantiseptik:

- Entfernen Sie – wenn erforderlich – die Haare an der betroffenen Hautstelle.
- Baden oder Waschen des Patienten bzw. der betreffenden Hautstelle (z. B. mit esemtan® oder octenisan® Waschlotion) möglichst eine Stunde vor der Hautdesinfektion.
- Auftragen von kodan® Tinktur forte mittels eines sterilen Tupfers oder aufsprühen.
- Sofern Inzisionsfolien verwendet werden, muss vor dem Aufkleben der Folie auf eine ausreichende Abtrocknung von kodan® Tinktur forte geachtet werden, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen.
- Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind.

Wund- und Nahtversorgung

Zur Wund- und Nahtversorgung kann kodan® Tinktur forte entweder mit einem sterilen Tupfer aufgetragen oder direkt aufgesprüht werden. Es ist darauf zu achten, dass überflüssige Präparatemengen abfließen können bzw. abgetupft werden. Operationsnähte werden vorzugsweise mit einem getränkten Tupfer abgetupft.

Hygienische Händedesinfektion

Bei der hygienischen Händedesinfektion sollten die Hände während der gesamten Einwirkzeit gut angefeuchtet bleiben.

Mikrobiologische Wirksamkeit

- Bakterizid inkl. Mykobakterien (TbB) • fungizid • begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes simplex Viren) • viruzid gegen Rota- und Adenovirus

Einwirkzeiten

Anwendungsgebiet/Keime	Anwendungsempfehlung/ Einwirkungszeit
Talgdrüsenarme Haut (gemäß VAH-/DGHM-Zerifikat):	
• Vor Injektionen und Blutentnahmen:	15 Sek.
• Vor Gelenkpunktionen:	60 Sek.
• Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion:	60 Sek.
Vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut im Bereich des Schädels und der Stirn wiederholt auftragen	2 Min.
Hygienische Händedesinfektion (gemäß VAH-/DGHM-Zerifikat):	3 ml kodan® Tinktur forte farblos unverdünnt – 30 Sek.
MRSA	30 Sek.
Viren:	
begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes simplex Viren):	15 Sek.
Rotavirus	30 Sek.
Adenovirus	10 Min.
ÖGHMP-Liste	
(nur kodan® Tinktur forte farblos)	
Hygienische Händedesinfektion:	unverdünnt 3 ml während 30 Sek. einreiben

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

kodan® Tinktur forte

Produkt Daten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

45,0 g 2-Propanol, 10,0 g 1-Propanol, 0,20 g 2-Biphenylol

Sonstige Bestandteile:

Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser

kodan® Tinktur forte gefärbt enthält zusätzlich die Farbstoffe

E 104, E 110, E 151.

Chemisch-physikalische Daten:

gefärbt

Aussehen: braun
Dichte: 0,896 ± 0,003 g/cm³

farblos

Aussehen: farblos
Dichte: 0,896 ± 0,003 g/cm³
Temperaturstabilität: stabil zwischen -5 °C und +40 °C
Flammpunkt: 24 °C (nach DIN 51 755)

Besondere Hinweise

kodan® Tinktur forte wird unverdünnt angewendet, dabei ist auf eine vollständige Benetzung der zu behandelnden Hautareale zu achten.

Zur äußeren Anwendung. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Brennbar. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
kodan® Tinktur forte farblos		
6 ml-Tupfflasche	40 x 6 ml	104 021
250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	10 x 250 ml	104 005
1 l-Flasche	10 x 1 l	104 007
2 l-Flasche	5 x 2 l	104 006
Anstaltspackungen		
250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	10 x 250 ml	104 012
1 l-Flasche	10 x 1 l	104 007
2 l-Flasche	5 x 2 l	104 010
kodan® Tinktur forte gefärbt		
250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	10 x 250 ml	104 802
1 l-Flasche	10 x 1 l	104 804
2 l-Flasche	5 x 2 l	104 803

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
Sprühkopf für 1 l-Flasche (1 Sprühstoß = 1,2 ml +/- 0,1 ml)	180 112
Tupfer-Dispenser für 1 l-Flasche	129 003

Detaillierte Informationen finden Sie in der s&m-Präparate-Information „Zubehör und Dosierhilfen“.

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com

kodan® Tinktur forte farblos

• **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. • **Sonstige Bestandteile:** Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. • **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a. Zur Wund- und Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. • **Gegenanzeigen:** Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. • **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. -V01-

kodan® Tinktur forte gefärbt

• **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. • **Sonstige Bestandteile:** Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. • **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Wund- und Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. • **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. • **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. • **Pharmazeutischer Unternehmer:** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt
Zul.-Nr. 1272.00.00 kodan® Tinktur forte farblos
Zul.-Nr. 1272.00.01 kodan® Tinktur forte gefärbt
-V01-



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60
office.austria@schuelke.com