

Bananen-
Geschmack

Marax[®] 800 mg Kautabletten

Wirkstoff: Magaldrat

Gegen Sodbrennen,
säurebedingte Magenbeschwerden,
Magen- und Zwölffingerdarm-
geschwür

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Marax[®] 800 mg Kautabletten

Wirkstoff: Magaldrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Marax[®] 800 mg Kautabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Marax[®] 800 mg Kautabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Marax[®] 800 mg Kautabletten beachten?
3. Wie sind Marax[®] 800 mg Kautabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Marax[®] 800 mg Kautabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Marax[®] 800 mg Kautabletten und wofür wird es angewendet?

Marax[®] 800 mg Kautabletten sind ein Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure (Antazidum).

Es wird angewendet zur Behandlung von Symptomen der Erkrankungen, bei denen Magensäure gebunden werden soll:

- Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden
- Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Marax[®] 800 mg Kautabletten beachten?

Marax[®] 800 mg Kautabletten darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Magaldrat oder einem der sonstigen Bestandteile von Marax[®] 800 mg Kautabletten sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Marax[®] 800 mg Kautabletten ist erforderlich

- wenn Ihre Nierenfunktion eingeschränkt ist
- oder bei langfristigem Gebrauch.

In diesen Fällen dürfen Sie Marax[®] 800 mg Kautabletten nur unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle bestimmter Blutwerte (Aluminium) einnehmen.

Kinder

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an Kinder unter 12 Jahren, da in dieser Altersgruppe keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Bei Einnahme/Anwendung von Marax[®] 800 mg Kautabletten mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/

angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Aufnahme und damit auch die Wirkung von anderen Arzneimitteln kann durch Marax[®] 800 mg Kautabletten vermindert werden. Deswegen sollte die Einnahme anderer Arzneimittel 2 Stunden vor oder nach der Einnahme von Marax[®] 800 mg Kautabletten erfolgen.

Insbesondere sind diese Wechselwirkungen bei bestimmten Antibiotika (Arzneimittel gegen Infektionskrankheiten, z. B. Tetracyclinen, Ciprofloxacin, Ofloxacin und Norfloxacin) zu beachten, so dass während einer Therapie mit diesen Antibiotika eine Einnahme des Arzneimittels nicht empfohlen werden kann.

Bei Einnahme/Anwendung von Marax[®] 800 mg Kautabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die gleichzeitige Einnahme von Marax[®] 800 mg Kautabletten und säurehaltigen Getränken (z. B. Obstsaft, Wein) führt zu einer unerwünschten Steigerung der Aluminiumaufnahme aus dem Darm. Auch Brausetabletten enthalten Fruchtsäuren, die die Aluminiumresorption steigern können.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft:

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis sollte vor der Einnahme von aluminiumhaltigen Antacida während der Schwangerschaft sorgfältig abgewogen werden. Das Arzneimittel soll in der Schwangerschaft nur kurzfristig angewendet werden, um eine Aluminiumbelastung des Kindes zu vermeiden.

Stillzeit:

Aluminiumverbindungen gehen in die Muttermilch über. Ein Risiko für das Neugeborene ist nicht anzunehmen, da nur sehr geringe Mengen aufgenommen werden.

40018000-09/12

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Marax® 800 mg Kautabletten

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Marax® 800 mg Kautabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Marax® 800 mg Kautabletten einzunehmen?

Nehmen Sie Marax® 800 mg Kautabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: **Kinder über 12 Jahre und Erwachsene** nehmen bei Bedarf mehrmals täglich ½ – 1 Kautablette ein.

Die Tagesdosis sollte 8 Stück Marax® 800 mg Kautabletten (entsprechend 6.400 mg Magaldrat) nicht überschreiten.

Die Kautabletten werden gut zerkaut eingenommen.

Nehmen Sie Marax® 800 mg Kautabletten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage ein.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Marax® 800 mg Kautabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Marax® 800 mg Kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungen durch Marax® 800 mg Kautabletten sind aufgrund der geringen Aufnahme des Arzneistoffs in das Blut unwahrscheinlich.

Bei Überdosierung kann es zu Änderungen des Stuhlverhaltens wie Stuhlerweichung und Zunahme der Stuhlhäufigkeit kommen. Besondere Maßnahmen sind hier im Allgemeinen nicht erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Marax® 800 mg Kautabletten vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Marax® 800 mg Kautabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten
Nicht bekannt:	Häufigkeit aufgrund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

- Magen-Darm-Bereich: Sehr häufig treten weiche Stühle auf. Durchfälle, Verstopfung und Knochenerweichung werden sehr selten beobachtet.
- Bei ungenügender Nierenleistung oder bei langfristiger Einnahme hoher Dosen kann die Einnahme von Marax® 800 mg Kautabletten einen erhöhten Magnesium- und Aluminiumgehalt des Blutes verursachen. Es kann zur Aluminiumeinlagerung vor allem in das Nerven- und Knochengewebe und zur Phosphatverarmung kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Marax® 800 mg Kautabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blisterstreifen nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30 °C lagern.

6. Weitere Informationen

Was Marax® 800 mg Kautabletten enthält:

Der Wirkstoff ist: Magaldrat.

1 Kautablette enthält 800 mg Magaldrat (bezogen auf die wasserfreie Substanz).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sorbitol, mikrokristalline Cellulose, Bananen-Aroma, Sahne-Aroma, Magnesiumstearat (Ph.Eur.).

Wie Marax® 800 mg Kautabletten aussieht und Inhalt der Packung:

Die Kautabletten sind groß, quadratisch, weiß und mit einer beidseitigen Bruchkerbe versehen.

Marax® 800 mg Kautabletten ist in Packungen zu 20, 50 und 100 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pinnuallee 4, 25436 Uetersen
Telefon: 0 41 22 / 712-0
Telefax: 0 41 22 / 712-220
E-Mail: info@nordmark-pharma.de

Mitvertrieb:

Nordix Pharma Vertrieb GmbH
Pinnuallee 4
25436 Uetersen

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2012.