

Gebrauchsanweisung**MOVICOL® flüssig Orange,****Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen****Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich.

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss MOVICOL® flüssig Orange jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

1. Was ist MOVICOL® flüssig Orange und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange beachten?
3. Wie ist MOVICOL® flüssig Orange einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MOVICOL® flüssig Orange aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MOVICOL® FLÜSSIG ORANGE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Der Name dieses Produktes ist MOVICOL® flüssig Orange, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Es ist ein Produkt aus der Gruppe der Laxanzien zur Behandlung von akuter und chronischer Verstopfung bei Erwachsenen, Jugendlichen und älteren Patienten. Es wird für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. Es stehen andere MOVICOL®-Produkte für diese Patientengruppen zur Verfügung.

MOVICOL® flüssig Orange verhilft Ihnen zu einer komfortablen Darmtätigkeit, selbst wenn Sie bereits über einen langen Zeitraum unter Verstopfung gelitten haben.

MOVICOL® flüssig Orange wird nicht zur Behandlung von Koprostase empfohlen. Alternative MOVICOL®-Produkte stehen für die Behandlung der Koprostase zur Verfügung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MOVICOL® FLÜSSIG ORANGE BEACHTEN?

Nehmen Sie MOVICOL® flüssig Orange nicht ein, wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie eine der folgenden Beschwerden haben:

- Darmverengung oder Darmverschluss
- Gefahr eines Darmdurchbruches (Perforation)
- schwere entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder toxisches Megakolon
- Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von MOVICOL® flüssig Orange.

Besondere Vorsicht bei MOVICOL® flüssig Orange:**• Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sprechen Sie vor der Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange mit Ihrem Arzt.

• Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wird von MOVICOL® flüssig Orange nicht beeinträchtigt.

• Niereninsuffizienz

Es ist keine Dosisanpassung für Patienten mit Niereninsuffizienz erforderlich.

• Bei Einnahme mit anderen Produkten

Die Wirksamkeit einiger Arzneimittel, wie beispielsweise Antiepileptika, kann während der Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange verringert sein. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von MOVICOL® flüssig Orange

Dieses Medizinprodukt enthält Ethyl- und Methyl-4-hydroxybenzoat, welche Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen hervorrufen können.

Es enthält auch:

- eine kleine Menge an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro 25 ml Dosis
- 45,6 mg an Benzylalkohol in jeder hergestellten 125 ml Dosis
Die angegebene Dosis darf nicht überschritten werden.

3. WIE IST MOVICOL® FLÜSSIG ORANGE EINZUNEHMEN?

Sie können dieses Produkt zu jeder beliebigen Zeit und unabhängig von der Aufnahme von Nahrungsmitteln und Getränken einnehmen.

Verstopfung:

Dieses Produkt darf nicht unverdünnt eingenommen werden.

Eine Dosis von MOVICOL® flüssig Orange entspricht 25 ml Flüssigkeit, welche mit 100 ml Wasser verdünnt wird.

Entsprechend der Schwere Ihrer Verstopfung nehmen Sie die gebrauchsfertige Lösung 1- bis 3-mal täglich ein.

Herstellen der Lösung:

Öffnen Sie die Flasche und messen Sie 25 ml oder 5 Teelöffel-Füllungen (zu je 5 ml) ab. Geben Sie die Flüssigkeit in ein Glas und fügen Sie etwa 100 ml (ungefähr ein halbes Glas) Wasser hinzu. Rühren Sie so lange, bis sich die Flüssigkeit gleichmäßig vermischt hat und die MOVICOL® flüssig Orange-Lösung klar ist. Nun können Sie die Lösung trinken.

Bitte spülen Sie die Dosierhilfe nach Gebrauch aus und setzen Sie sie wieder auf die Flasche.

Dauer der Anwendung:**Verstopfung:**

Die Behandlung mit MOVICOL® flüssig Orange dauert üblicherweise ca. 2 Wochen. Wenn Sie MOVICOL® flüssig Orange über einen längeren Zeitraum einnehmen müssen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Wenn Ihre Verstopfung von einer Krankheit wie z. B. Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose (MS) verursacht wird oder wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Verstopfung verursachen, kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen, MOVICOL® flüssig Orange länger als 2 Wochen einzunehmen.

Für die Langzeitbehandlung kann diese Dosis gewöhnlich auf 1 oder 2 Dosen pro Tag reduziert werden.

Wenn Sie eine größere Menge MOVICOL® flüssig Orange eingenommen haben, als Sie sollten

Es kann sein, dass Sie Durchfall bekommen, welcher zu einer Austrocknung des Körpers führen kann. Falls dies eintritt, stoppen Sie die Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange und trinken Sie reichlich Flüssigkeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange vergessen haben

Nehmen Sie die Dosis ein, sobald Sie sich daran erinnern.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

MOVICOL® flüssig Orange kann Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nehmen Sie MOVICOL® flüssig Orange nicht mehr ein und informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn:

- Sie eine schwerwiegende allergische Reaktion bekommen, die Schwierigkeiten beim Atmen oder ein Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals- und Rachenbereich auslöst.

Weitere Nebenwirkungen beinhalten:

Allergische Reaktionen (die Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut oder Nesselsucht auslösen können), geschwollene Hände, Füße oder Knöchel, Kopfschmerzen und erhöhte und erniedrigte Kaliumkonzentrationen im Blut.

Manchmal können bei Ihnen Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen oder vermehrte Darmgeräusche auftreten. Sie können sich auch aufgebläht fühlen, an Blähungen, Übelkeit oder Erbrechen leiden, Reizungen des Darmausgangs und bei Beginn der Einnahme von MOVICOL® flüssig Orange einen leichten Durchfall verspüren. Diese Nebenwirkungen verbessern sich im Allgemeinen, sobald die Dosis von MOVICOL® flüssig Orange reduziert wird.

Wenn eine der oben genannten Nebenwirkungen störend wirkt oder länger als ein paar Tage andauert oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. WIE IST MOVICOL® FLÜSSIG ORANGE AUFZUBEWAHREN?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Nicht über 30°C lagern.

Nicht verbrauchtes Produkt 30 Tage nach erster Öffnung verwerfen.

Sobald Sie MOVICOL® flüssig Orange in Wasser verdünnt haben und es nicht umgehend vollständig trinken können, halten Sie es verschlossen und lagern Sie es im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur. Entsorgen Sie die Lösung, die Sie nicht innerhalb von 24 Stunden aufgebraucht haben.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Jede 25 ml MOVICOL® flüssig Orange enthalten folgende Bestandteile:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumchlorid	0,3507 g
Natriumhydrogencarbonat	0,1785 g
Kaliumchlorid	0,0466 g

MOVICOL® flüssig Orange enthält auch gereinigtes Wasser, Orangenaroma sowie Acesulfam-Kalium (E950) und Sucralose (E955) als Süßungsmittel.

Es enthält auch ein Konservierungsmittel, welches Benzylalkohol, Methyl-4-hydroxybenzoat (E218) und Ethyl-4-hydroxybenzoat (E214) beinhaltet.

Das Orangenaroma enthält die folgenden Bestandteile: Aromastoffe, Aromazubereitungen und Ethanol (Alkohol).

Für jede 25 ml ergeben sich nach Verdünnung mit 100 ml Wasser folgende Werte:

Natrium	65 mmol/l
Chlorid	53 mmol/l
Kalium	5,4 mmol/l
Hydrogencarbonat	17 mmol/l

Wie MOVICOL® flüssig Orange aussieht und Inhalt der Packung

Jede Packung besteht aus einem Karton mit einer Plastikflasche MOVICOL® flüssig Orange mit 250 ml oder 500 ml Lösung und einer Dosierhilfe aus Plastik.

Hersteller:

Norgine B.V.,
Hogehilweg 7,
1101 CA Amsterdam ZO,
Niederlande

Mitvertrieb:

Norgine GmbH, Im Schwarzenborn 4,
35041 Marburg
Tel. 06421 / 98520
Fax 06421 / 985230
Internet: www.norgine.de
E-mail: Info@norgine.de



Falls Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Sie das Unternehmen kontaktieren möchten, das MOVICOL® flüssig Orange herstellt, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse, wo man Ihnen gern weiterhelfen wird.

Hersteller der Dosierhilfe: Bormioli Rocco & figlio Spa, Viale Martiri della Libertà no.1, 43026 Fidenza, Italien (CE0373).

Stand der Informationen: Mai 2011

MOVICOL® und Norgine sind eingetragene Handelsmarken der Norgine-Unternehmensgruppe.

