

# Sanum

## Mucokehl® D7 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D7
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D7 aquos. dilut. (HAB, Vorschrift 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2x wöchentlich 1 Ampulle zu 1,0 ml s.c. injizieren. Nach Anbruch etwaige nicht verbrauchte Reste verwerfen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Mucokehl® D7 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Mucokehl® D7 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei &#8226; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Mucor racemosus). &#8226; Kindern unter 12 Jahren &#8226; Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Mucokehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist

ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

---

Zusatzhinweis: Mucor racemosus ist als Wirkstoff auch in dem Kombinationspräparat SANKOMBI enthalten.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform: 1/10/50 Ampullen à 1 ml.

---

Stand vom: 912