

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?
3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?

Gebrauchsinformation

neo-angin Halstabletten zuckerfrei

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,20 mg

Amylmetacresol 0,60 mg

Levomenthol 5,72 mg

Sonstige Bestandteile:

Sternanisöl, Pfefferminzöl, Maltitol-Lösung (Trockensubstanz), Weinsäure (Ph.Eur.), Ponceau 4R (Zubereitung 80 %).

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind in Packungen mit 24 und 48 Lutschtabletten erhältlich.

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?:

1.1 neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind ein Mund- und Rachentherapeutikum

1.2 von: DIVAPHARMA GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Tel. 030/72007-266

Fax 030/72007-352

1.3 neo-angin® Halstabletten zuckerfrei werden angewendet:

Zur Desinfizierung des Mund- und Rachenraumes bei Halsschmerzen, Heiserkeit, Katarrh, Erkältung, Angina, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes sowie des Zahnfleisches.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?

2.1 neo-angin® Halstabletten zuckerfrei dürfen nicht angewendet werden:

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4 Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind.

– bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes),

– bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.

Zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sollten deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei ist erforderlich

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol. Bitte nehmen Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei einzunehmen?

Nehmen Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung:

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen alle 2-3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden).

Hinweis für Diabetiker: Eine neo-angin® Halstablette zuckerfrei – mit dem Zuckeraustauschstoff Maltitol – entspricht 0,22 BE. Maltitol wird unter Insulinbeteiligung abgebaut.

Wenden Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage an.

3.3 Wenn Sie die Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vergessen haben:

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, bitte nehmen Sie dann nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann neo-angin® Halstabletten zuckerfrei Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten

Häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten

Gelegentlich: mehr als 1 von 1.000 Behandelten

Selten: mehr als 1 von 10.000 Behandelten

Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und der

Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Lutschtabletten mit Maltitol-Lösung/Trockensubstanz sind hygroskopisch, d.h. sie ziehen Feuchtigkeit aus der Umgebung an. Zur Aufbewahrung sollten neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25 °C gelagert werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Oktober 2006