


Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

NeoChinosol® Tabletten 25 mg

Ethacridinlactat-Monohydrat



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen NeoChinosol Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was sind NeoChinosol Tabletten und wofür werden sie angewendet?**
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von NeoChinosol Tabletten beachten?**
- 3. Wie sind NeoChinosol Tabletten anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie sind NeoChinosol Tabletten aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

1. WAS SIND NEOCHINOSOL TABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

NeoChinosol Tabletten sind ein Mund- und Rachentherapeutikum.

NeoChinosol Tabletten werden angewendet zur Herstellung einer antiseptischen Spülung für den Mundbereich.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NEOCHINOSOL TABLETTEN BEACHTEN?

NeoChinosol Tabletten dürfen nicht angewendet werden

bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ethacridinlactat, andere Acridinabkömmlinge oder einen der sonstigen Bestandteile.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von NeoChinosol Tabletten ist erforderlich

Vorsicht bei frischen Wunden, da Granulationshemmung möglich. Die Lösung sollte vor der Verwendung möglichst frisch hergestellt werden (siehe auch unter "5. Wie sind NeoChinosol Tabletten aufzubewahren?").

Die zubereitete Lösung aus NeoChinosol Tabletten darf nicht im Augenbereich angewendet werden.

Bei Anwendung von NeoChinosol Tabletten mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die aus NeoChinosol Tabletten zubereitete Lösung nicht mit anderen Lösungen mischen, da es sonst zu Ausflockungen kommen kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Erfahrungen über die Sicherheit beim Menschen mit der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Es ist nicht bekannt, ob Ethacridinlactat-Monohydrat in die Muttermilch übergeht. NeoChinosol Tabletten sollen deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. WIE SIND NEOCHINOSOL TABLETTEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie NeoChinosol Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosis ist

Die Anwendung sollte 2mal täglich, morgens und abends erfolgen. Die maximale Tagesdosis von 4 Mundspülungen sollte nicht überschritten werden.

Art der Anwendung

NeoChinosol Tabletten sind zur Anwendung in der Mundhöhle bestimmt.

Lösen Sie 1 Tablette NeoChinosol unter Rühren in 100 ml (1 Glas) lauwarmem Wasser auf.

Die Tablette löst sich nicht rückstandslos auf. Die zubereitete Lösung kann angewendet werden, sobald die Tablette vollständig zerfallen ist (kann einige Minuten dauern).

Mit der zubereiteten Lösung sollten Sie den Mund gut ausspülen.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie NeoChinosol Tabletten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 7 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von NeoChinosol Tabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von NeoChinosol Tabletten angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie versehentlich etwas Flüssigkeit verschlucken, so ist dies unbedenklich. Bei Verschlucken einer großen Menge von NeoChinosol Tabletten, insbesondere durch Kinder, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie die Anwendung von NeoChinosol Tabletten vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von NeoChinosol Tabletten abbrechen

Sie könnten den Behandlungserfolg gefährden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung mit NeoChinosol Tabletten abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis:

Eine vorübergehende Gelbfärbung der Zunge kann auftreten, da das Arzneimittel auf der Mundschleimhaut gut haftet und sich eine gelbe Wirk- und Schutzschicht bildet.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können NeoChinosol Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich, vor allem in Verbindung mit Sonnenlicht, können allergische Reaktionen der Haut auftreten, die jedoch nach Absetzen der Lösung rasch verschwinden. Selten wurden Schwelungen im Gesicht, juckender nesselartiger Ausschlag, Kopfschmerzen und leichte Krämpfe beobachtet. Gelegentlich kann es zu entzündlichen Hautreaktionen kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND NEOCHINOSOL TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 30 °C lagern.

Die zubereitete Lösung darf nicht längere Zeit im Sonnenlicht stehen, da sie sich dann zersetzen kann. Die Zersetzung macht sich durch zunehmende Braunfärbung bemerkbar.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Packung nach «Verwendbar bis» angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Zubereitung:

Die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen Zubereitung wurde bei Raumtemperatur über 7 Tage nachgewiesen. Aus mikrobiologischer Sicht empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, die gebrauchsfertige Zubereitung dennoch möglichst sofort (innerhalb eines Tages) zu verwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was NeoChinosol Tabletten enthalten

Der Wirkstoff ist Ethacridinlactat-Monohydrat.

1 Tablette enthält 25 mg Ethacridinlactat-Monohydrat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Macrogol 6000, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie NeoChinosol Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

NeoChinosol Tabletten sind gelbe Tabletten und sind in Packungen zu 20 und 50 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089/64186-0

Fax: 089/64186-130

Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2015.

Wichtiger Hinweis für den Gebrauch

Die aus NeoChinosol Tabletten zubereitete Lösung färbt Haut, Wäsche und andere Gegenstände gelb. Ein Kontakt der Lösung mit Materialien, die sich einfärben können (z.B. Kleidungsstücke, Teppichböden, PVC-Böden etc.), sollte vermieden werden.

Tücher, die mit der Lösung getränkt wurden, nicht mit anderen Textilien zusammen in der Waschmaschine waschen.

Frische Flecken lassen sich aus der Wäsche durch einfaches Waschen leicht entfernen, nach Eintrocknung und Oxidation hingegen nur schwer.

Weitere Hinweise zur Fleckenentfernung unter www.chinosol-rivanol.de

Möchten Sie mehr zu NeoChinosol Tabletten wissen?
Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre an.

