zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Sanum

Nigersan® D3 Zäpfchen

Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Aspergillus niger e volumine mycelii (lyophil., steril.) D3 trit.
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: 0,2 g Aspergillus niger e volumine mycelii (lyophil., steril.) D3 trit. (HAB, Vorschrift 6). Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren führen 1x täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Nigersan® D3 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Nigersan® D3 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Aspergillus niger ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Aspergillus niger) • Autoimmunerkrankungen • bei Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Nigersan® D3 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Hinweis:	Enthält Lactose.
Zusatzhinweis:	Aspergillus niger ist als Wirkstoff auch im Kombinationspräparat Sankombi® enthalten.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 10 Zäpfchen Bündelpackung 10x 10 Zäpfchen.
Stand vom:	008

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012