zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

OptiMahl® Zink 15 mg	**50 TAB**	**PZN 01691495**
	100 TAB	**PZN 00993797**

OptiMahl® Zink ist eine magensaftresistente, Lactose- und Glutenfreie Filmtablette.

Indikation: Adjuvanz bei der Behandlung der Akne, Neurodermitis, Wundheilungsstörungen, Haarausfall und Steigerung der körpereigenen Abwehrkräfte.

Dosierung: Täglich 1 Tablette 30-60 Minuten vor einer Mahlzeit.

Wirkstoff je Tablette: 15mg Zink = 104,5mg Zink-D-gluconat
80mg L-Histidin

Sonst. Bestandteile: Füllstoff: Sorbit
Maisstärke
Trennmittel: Talkum
Überzugsmittel: Ethylcellulose
Trennmittel: Magnesiumsalze
Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose
Überzugsmittel: Natriumalginat
Füllstoff: Siliciumdioxid
Füllstoff: Pflanz. Öle
Trennmittel: Stearinsäure

Hyposens® Lotion	**100g Lotion**	**PZN 04745435**
Lipidgehalt: 24%	**200g Lotion**	**PZN 04746015**
(pH-Wert 5,9-6,6)	**500g Lotion**	**PZN 04746021**

Hyposens® Lotion ist frei von: Lanolin, Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.

Indikation: Zur Feuchtigkeitsregulierung der Hornschicht, Fettung und Juckreizstillung für die sehr trockene, juckende Haut und Altershaut. Therapiebegleitend z.B: atopisches Ekzem (Neurodermitis), Waschekzem, Puritus senilis.

Anwendung: 2x tgl. gleichmäßig dünn auf die Haut auftragen.

Wirkstoffe: 5% Urea, 2,5% Polidocanol, 0,5% Modukine.

Sonst. Bestandteile: Aqua, Paraffinum Liquidum, Urea, Pentylene Glycol, Laureth-9, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Polysorbate 60, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lactose, Lactis Proteinum, Carbomer, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Tocopherol, Sodium Hydroxide.

Gegenanz.: Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen. Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Nicht auf offene Hautstellen auftragen.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2015