

Liebe Patientin, lieber Patient!

015997/5001 GP DE

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

## Para-Benzochinon-Injeel® forte

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: para-Benzochinonum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,275 g, para-Benzochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a) 0,275 g, para-Benzochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a) 0,275 g, para-Benzochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) 0,275 g.

Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke. Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion  
10/100 Ampullen zu 1,1 ml.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-690  
E-Mail: info@heel.de

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

# -Heel

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Para-Benzochinon-Injeel forte nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Para-Benzochinon-Injeel forte sonst nicht richtig wirken kann!

*Wie viel von Para-Benzochinon-Injeel forte und wie oft sollten Sie Para-Benzochinon-Injeel forte anwenden?*

2-1mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren.

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

### Nebenwirkungen:

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Para-Benzochinon-Injeel forte auftreten?*


Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Sollten Sie jedoch Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.


### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!



#### Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



#### Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.