

Sanum

Pefrakehl® D3 Salbe



Darreichungsform:	Salbe zum Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Candida parapsilosis D3
Zusammensetzung:	1 g Salbe enthält: 0,10 g Candida parapsilosis D3 dil. (HAB, Vorschrift 5a, mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: 0,38 g Wollwachsalkoholsalbe, 0,10 g mittelkettige Triglyceride, 0,03 g Glycerolmonostearat 40-55, 0,23 g Propylenglycol, 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H ₂ O, 0,01 g Milchsäure, 0,13 g Wasser für Injektionszwecke.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Pilzen (Candida parapsilosis).
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B.

Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann ebenfalls Hautreizungen hervorrufen.

Zusatzhinweis: Candida parapsilosis ist als Wirkstoff auch in dem Kombinationspräparat Exmykehl® enthalten.

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 30 g Tube, 10x 30 g Bündelpackung.

Stand vom: 107