

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

PENTOFURYL[®] Kapseln

Wirkstoff: Nifuroxazid

Zusammensetzung:

1 Kapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Nifuroxazid, 200 mg

sonstige Bestandteile: Stärke, Saccharose, Magnesiumstearat, Gelatine

Hinweis:

1 Kapsel enthält 0,072g Saccharose entsprechend 0,006 BE

Originalpackungen mit 16 Kapseln (N1) oder 32 Kapseln (N2)

PENTOFUYRL[®] ist ein Durchfallmittel (Darmantiseptikum)

Anwendungsgebiete:

Akute und chronische Durchfallerkrankungen infolge von Infektionen mit nifuroxazidempfindlichen Erregern.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie PENTOFUYRL[®] nicht anwenden?

Gegenanzeigen sind keine bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt PENTOFUYRL[®] nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da PENTOFUYRL[®] sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel und wie oft sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab dem 10. Lebensjahr 2 bis 4 Kapseln über den Tag verteilt ein.

Wie lange sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

PENTOFUYRL[®] sollte nur in ärztlich begründeten Ausnahmefällen länger als 7 Tage angewendet werden.

Wie und wann sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

Die Kapseln werden mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) eingenommen. Der Inhalt von PENTOFUYRL[®] Kapseln kann auch mit den Mahlzeiten vermischt eingenommen werden. Nifuroxazid löst sich nicht in Wasser.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu beachten, wenn PENTOFUYRL[®] in zu großen Mengen angewendet wurde?

Da der Wirkstoff von PENTOFUYRL[®] nicht resorbiert wird, sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von PENTOFUYRL[®] auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen unter der Therapie mit PENTOFUYRL[®] bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum der Kapseln dieser Packung ist auf dem Blisterstreifen und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie die Kapseln dieser Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Datum!

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Pharmazeutischer Unternehmer:



Rodheimer Str. 90, 35452 Heuchelheim

Tel.: +49 (0)641 - 9626610 Fax: +49 (0)641 - 62817

E-Mail: info@linden-arznei.de

www.linden-arzneimittel.de

Hersteller:

Lavipharm S.A. - Agias Marinas Str. - GR-19002 Peania

Stand der Information: November 2007