

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

PENTOFURYL[®] Saft 125ml

Wirkstoff: Nifuroxazid

Zusammensetzung:

125 ml Suspension enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Nifuroxazid 2,5 g

wirksamer Bestandteil: Natriummethyl-4-hydroxybenzoat

sonstige Bestandteile: Xanthangummi, Natriumhydroxid, Citronensäure-monohydrat, Sucrose, Bananenaroma, Ethanol 96%, gereinigtes Wasser

Hinweis: 1 Teelöffel (5ml) enthält 1,1g Saccharose entsprechend 0,092 BE

Originalpackung mit 125 ml Suspension

PENTOFUYRL[®] ist ein Durchfallmittel (Darmantiseptikum)

Anwendungsgebiete:

Akute und chronische Durchfallerkrankungen infolge von Infektionen mit nifuroxazidempfindlichen Erregern.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie PENTOFUYRL[®] nicht anwenden?

Gegenanzeigen sind keine bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt PENTOFUYRL[®] nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da PENTOFUYRL[®] sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel und wie oft sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen über den Tag verteilt ein:

Frühgeborene, Neugeborene	1-3 Teelöffel
Säuglinge bis 1 Jahr	3-4 Teelöffel
Kinder ab 1 Jahr	4-6 Teelöffel
Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre	4-8 Teelöffel

Enthält 1,3 Vol.-% Alkohol

Wie lange sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

PENTOFUYRL[®] sollte nur in ärztlich begründeten Ausnahmefällen länger als 7 Tage angewendet werden.

Wie und wann sollten Sie PENTOFUYRL[®] einnehmen?

Die Suspension ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu beachten, wenn PENTOFUYRL[®] in zu großen Mengen angewendet wurde?

Da der Wirkstoff von PENTOFUYRL[®] nicht resorbiert wird, sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von PENTOFUYRL[®] auftreten?

Aufgrund des Gehaltes an Natriummethyl-4-hydroxybenzoat (Paraben) können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Suspension ist auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Suspension nicht mehr nach diesem Datum!

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Pharmazeutischer Unternehmer:



Rodheimer Str. 90, 35452 Heuchelheim

Tel.: +49 (0)641 - 9626610 Fax: +49 (0)641 - 62817

E-Mail: info@linden-arznei.de

www.linden-arzneimittel.de

Hersteller:

Lavipharm S.A. - Agias Marinas Str. - GR-19002 Peania

Stand der Information: Februar 2002