

Sanum

Pinikehl® D5 Flüssige Verdünnung



| | |
|---------------------------------|---|
| Darreichungsform: | Tropfen zum Einnehmen und Einreiben |
| Präparatgruppe: | Pilzpräparat |
| Wirkstoff: | Fomitopsis pinicola e volumine mycelii (lyophil. steril.) D5 dil. |
| Zusammensetzung: | 10 ml enthalten: 10 ml Fomitopsis pinicola e volumine mycelii (lyophil. steril.) D5 dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser). |
| Erfahrungsgemäß angewendet bei: | Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. |
| Anwendung: | <p>Zum Einnehmen: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 1-2 mal täglich je 5 Tropfen ein.</p> <p>Zum Einreiben in die Haut: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren reiben 2x wöchentlich 5-10 Tropfen in die Ellenbeuge ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Pinikehl® D5 abgesetzt werden.</p> |
| Nebenwirkungen: | Aufgrund des Gehaltes von Pinikehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Fomitopsis pinicola ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. |
| Gegenanzeigen: | <p>Nicht anwenden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überempfindlichkeiten gegenüber Fomitopsis pinicola • Autoimmunerkrankungen |

- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen: Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Pinikehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 10 ml Tropfflasche, 10x 10 ml Bündelpackung.

Stand vom: 103