

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

POLYXAN® BLAU Creme

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahre

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss POLYXAN® BLAU Creme jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist POLYXAN® BLAU Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von POLYXAN® BLAU Creme beachten?
3. Wie ist POLYXAN® BLAU Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist POLYXAN® BLAU Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist POLYXAN® BLAU Creme und wofür wird sie angewendet?

POLYXAN® BLAU Creme ist ein traditionelles homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Beschwerden durch **Verletzungen**. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Bei auftretenden Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung oder Eiterung, sowie bei allen anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von POLYXAN® BLAU Creme beachten?

POLYXAN® BLAU Creme darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von POLYXAN® BLAU Creme sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von POLYXAN® BLAU Creme:

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen.

POLYXAN® BLAU Creme soll nicht auf offene Wunden oder auf Schleimhäute aufgetragen werden. Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

Nach dem Auftragen sollten die Hände gereinigt werden.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von POLYXAN® BLAU Creme mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei Anwendung von POLYXAN® BLAU Creme zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wie alle Arzneimittel sollte POLYXAN® BLAU Creme in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

POLYXAN® BLAU Creme sollte in der Stillzeit nicht im Bereich der Brustwarzen angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von POLYXAN® BLAU Creme:

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist POLYXAN® BLAU Creme anzuwenden?

Wenden Sie POLYXAN® BLAU Creme immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

1-2 cm Salbenstrang 1-3 mal täglich auf die betroffenen Körperstellen auftragen.

Art und Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann POLYXAN® BLAU Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

In vereinzelten Fällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen möglich, die mit verstärkter Rötung und Überwärmung der betreffenden Hautstelle einhergehen können. In diesen Fällen setzen Sie bitte das Arzneimittel ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist POLYXAN® BLAU Creme aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum

nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was 10 g POLYXAN® BLAU Creme enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D6 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D8 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D10 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D12 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

mit je 0,555 g

Sonstige Bestandteile:

Oleyloleat (DAB), Ethanol 43 % (m/m), Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Weißes Vaseline, Gereinigtes Wasser.

Wie POLYXAN® BLAU Creme aussieht und Inhalt der Packung:

Weißes Creme in Tuben zu 50 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co KG

Klausenweg 12

69412 Eberbach

Telefon: 0 62 71 / 92 21 - 0

Telefax: 0 62 71 / 92 21 - 55

info@ritsert.de



Dr. Ritsert Pharma

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 01/2013.