

Gebrauchsinformation Information für den Anwender

POLYXAN® BLAU N comp. Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss POLYXAN® BLAU N comp. jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist POLYXAN® BLAU N comp. und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von POLYXAN® BLAU N comp. beachten?
3. Wie ist POLYXAN® BLAU N comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist POLYXAN® BLAU N comp. aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist POLYXAN® BLAU N comp. und wofür wird es eingenommen?

POLYXAN® BLAU N comp. ist ein traditionelles homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei **Erkältungen**. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von POLYXAN® BLAU N comp. beachten?

POLYXAN® BLAU N comp. darf nicht eingenommen/angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von POLYXAN® BLAU N comp. sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme/Anwendung von POLYXAN® BLAU N comp. ist erforderlich

Zur Anwendung von POLYXAN® BLAU N comp. bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. POLYXAN® BLAU N comp. sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme/Anwendung von POLYXAN® BLAU N comp. mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei Einnahme/Anwendung von POLYXAN® BLAU N comp. zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und der Stillzeit sollte wegen des Alkoholgehaltes POLYXAN® BLAU N comp. nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung hat POLYXAN® BLAU N comp. einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von POLYXAN® BLAU N comp.

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist POLYXAN® BLAU N comp. einzunehmen?

Nehmen Sie POLYXAN® BLAU N comp. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Bei akuten Beschwerden 3-mal täglich 8 - 10 Tropfen vor dem Essen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 2-mal täglich 8 Tropfen vor dem Essen einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge POLYXAN® BLAU N comp. eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden etwa 12 g Alkohol aufgenommen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von POLYXAN® BLAU N comp. zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann POLYXAN® BLAU N comp. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist POLYXAN® BLAU N comp. aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

10 g (= 10,8 ml) POLYXAN® BLAU N comp. enthalten die Wirkstoffe:

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D6 [HAB; V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D8 [HAB; V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D10 [HAB; V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)],

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D12 [HAB; V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)].

Der sonstige Bestandteil ist:
Ethanol 43% (m/m)

1 ml entspricht 30 Tropfen.

Wie POLYXAN® BLAU N comp. aussieht und Inhalt der Packung:

Mischung in Flaschen zu 30 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co KG

Klausenweg 12

69412 Eberbach

Tel.: 0 62 71 / 92 21 - 0

Fax: 0 62 71 / 92 21 - 55

info@ritsert.de

www.ritsert.de



Dr. Ritsert Pharma

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 06/2015.