



POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g



Wirkstoff: Kalium-4-aminobenzoat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g beachten?
3. Wie ist POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST POTABA-GLENWOOD® PULVER 3 G UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g ist ein Mittel gegen krankhafte Vermehrung von Bindegewebe (Antifibrotikum).

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g wird angewendet zur Verminderung des Fortschreitens der Penisverkrümmung bei noch aktiver Schwellkörperverhärtung des männlichen Gliedes (Induratio penis plastica, Ipp) mit einer Erkrankungsdauer unter 2 Jahren, wenn Sie die Krümmung als behindernd empfinden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON POTABA-GLENWOOD® PULVER 3 G BEACHTEN?

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g darf nicht eingenommen werden,

- bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Bestandteile von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g, insbesondere Kalium-4-aminobenzoat sowie parasubstituierten aromatischen Aminen (z.B. Benzocain, Procain, p-Hydroxybenzoesäureester)
- bei gleichzeitiger Einnahme von Sulfonamiden
- bei eingeschränkter Nierenfunktion (renale Insuffizienz)
- bei krankhaft erhöhtem Kaliumspiegel (Hyperkaliämie)
- bei schwerem Leberschaden und erhöhten Leberfunktionswerten (z.B. Transaminasen)

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g ist erforderlich,

- falls Sie an Allergien leiden
- bei fortgesetzter Einnahme trotz Erbrechens oder unzureichender Nahrungsaufnahme kann ein Absinken des Blutzuckerspiegels die Folge sein. Dies ist besonders zu beachten, falls Sie an Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) leiden.
- Bei allen Patienten, die POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g einnehmen, muss eine regelmäßige Kontrolle der Leberfunktion mindestens alle 4 Wochen erfolgen. Bei Erhöhung der Leberfunktionswerte muss POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g sofort abgesetzt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g ist für die Behandlung von Frauen nicht vorgesehen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Bei Einnahme von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung nachfolgender Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g beeinflusst werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Kalium-4-aminobenzoat (K-PAB) und von Sulfonamiden wird die Wirkung letzterer beeinträchtigt, da von den Bakterien bevorzugt K-PAB anstatt der Sulfonamide aufgenommen wird.

K-PAB verdrängt Methotrexat aus der Plasmasweißbindung und kann so dessen biologische Verfügbarkeit steigern.

Aufgrund des zugeführten Kaliums kann sich die Wirkung gleichzeitig verabfolgter Herzglykoside vermindern.

Ausserdem kann sich ein erhöhter Kaliumspiegel ergeben, wenn gleichzeitig Aldosteronantagonisten, Kaliumsparende Diuretika oder ACE-Hemmer eingenommen werden.

3. WIE IST POTABA-GLENWOOD® PULVER 3 G EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zum Einnehmen

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Einzeldosis für Erwachsene 1 Beutel 4 x täglich, was einer maximalen Tagesdosis von 4 Beuteln (entsprechend 12 g Kalium-4-aminobenzoat) entspricht.

Nehmen Sie POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g immer während einer Mahlzeit ein. Lösen Sie dazu das Pulver in einem Glas Wasser auf (ggf. umrühren). Die Lösung sollte gut gekühlt sein. Zur Geschmacksverbesserung kann Limonade oder Fruchtsaft nachgetrunken werden. Falls es Ihnen einmal nicht möglich sein sollte, während der Einnahme zu essen, verschieben Sie die Einnahme bis zur nächsten Mahlzeit.

Die Dauer der Anwendung von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g soll 1 Jahr nicht überschreiten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g eingenommen haben als Sie sollten

Gehen Sie beim nächsten Einnahmezeitpunkt zu der vom Arzt verordneten Menge über.

Wenn Sie die Einnahme von POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Gehen Sie beim nächsten Einnahmezeitpunkt zu der vom Arzt verordneten Menge über.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Allgemein: *Häufig:* Fieber, Schüttelfrost.

Haut und Unterhautzellgewebe: *Gelegentlich:* Hautausschlag (Exanthem, Ekzem, Dermatitis), Juckreiz.

Skelettmuskulatur und Bindegewebe: *Gelegentlich:* Gelenk- und Muskelschmerzen.

Leber und Gallenblase: *Gelegentlich:* Erhöhung der Leberwerte bis hin zur Gelbsucht, vermutlich aufgrund einer Überempfindlichkeitsreaktion.
Selten: Leberentzündung.

Verdauungstrakt: *Häufig:* Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Durchfall.

Blut: *Sehr selten:* Verminderung der weißen Blutkörperchen (Leukopenie) oder Blutplättchen (Thrombopenie).

Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Therapie mit POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g abgesetzt und der Arzt konsultiert werden.

5. WIE IST POTABA-GLENWOOD® PULVER 3 G AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Beutel und der Schachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g enthält:**

Der Wirkstoff ist: Kalium-4-Aminobenzoat.

1 Beutel enthält 3 g Kalium-4-Aminobenzoat.

Sonstige Bestandteile: keine.

Wie POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g aussieht und Inhalt der Packung:

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g ist erhältlich in Packungen mit 40 Beuteln bzw. Bündelpackungen mit 3 x 40 Beuteln.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

GLENWOOD GMBH

Postfach 1261

D-82302 Starnberg

Telefon: 08151-99879-0

e-mail: info@glenwood.de