



# Presselin LG Mischung

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Homöopathisches Arzneimittel

## Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Presselin LG jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Presselin LG und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Presselin LG beachten?
3. Wie ist Presselin LG einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Presselin LG aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST PRESSELIN LG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Presselin LG ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN LG BEACHTEN?

### Wann dürfen Sie Presselin LG nicht anwenden?

Presselin LG darf nicht angewendet werden bei einer Allergie gegen Kamille oder andere Korbblütler.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

### Kinder und Jugendliche

Geben Sie Presselin LG Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

### Bei Einnahme von Presselin LG mit anderen Arzneimitteln

Eine Beeinflussung der Wirkung von Presselin LG durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Bei Einnahme von Presselin LG zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Presselin LG hat keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin LG

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

## 3. WIE IST PRESSELIN LG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### Soweit nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### Wenn Sie eine größere Menge von Presselin LG eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungs- oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

**Wenn Sie die Einnahme von Presselin LG vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie die folgende Dosis zum nächsten Zeitpunkt ein, an dem Sie diese normalerweise einnehmen würden. Fahren Sie mit der Dosierung so fort, wie verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben.

**Wenn Sie die Einnahme von Presselin LG abbrechen:**

Sollten bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten über die weitere Behandlung.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Presselin LG Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST PRESSELIN LG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

**Was Presselin LG enthält:**

**Zusammensetzung:**

10 g (10 g entsprechen ca. 11 ml) enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:

Chamomilla recutita Ø	0,1 g
Chelidonium majus Dil. D7	1,2 g
Carum carvi Ø	0,1 g
Atropa bella-donna Dil. D4	3,5 g
Citrus colocythis e fructibus sine seminibus sicc. Dil. D7 [HAB, V. 4A; Ø mit Ethanol 86 % (m/m)]	3,5 g
Gentiana lutea Ø	0,1 g
Fel tauri (HAB 34) Dil. D4 [HAB, V. 5A, Lsg. D1 mit Ethanol 43 % (m/m)]	1,5 g

1 g entspricht 30 Tropfen

**Wie Presselin LG aussieht und Inhalt der Packung:**

Presselin LG ist in Flaschen mit 50 ml erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Combustin Pharmazeutische Präparate GmbH, Offinger Str.7  
88525 Hailtingen  
Telefon: 0 73 71 – 96 53 56  
[www.presselin.de](http://www.presselin.de)  
[info@combustin.de](mailto:info@combustin.de)

**Hersteller**

Spreewälder Arzneimittel GmbH, Schulstraße 9,  
15913 Märkische Heide  
[www.spreewaelder-arzneimittel.de](http://www.spreewaelder-arzneimittel.de)  
[info@spreewaelder-arzneimittel.de](mailto:info@spreewaelder-arzneimittel.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2015.**

*Presselin wünscht gute Besserung!*