



## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**Wirkstoffe:** Camphora Dil. D1 und Crataegus Ø

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PROCORDAL<sup>®</sup> liquid jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist PROCORDAL<sup>®</sup> liquid und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid beachten?
3. Wie ist PROCORDAL<sup>®</sup> liquid einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PROCORDAL<sup>®</sup> liquid aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. Was ist PROCORDAL<sup>®</sup> liquid und wofür wird es angewendet?

PROCORDAL<sup>®</sup> liquid ist ein homöopathisches Herzmittel.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Beschwerden bei Herzschwäche.**

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Ansammlung von Wasser in den Beinen oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid beachten?

**PROCORDAL<sup>®</sup> liquid darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid sind.
- von Alkoholkranken.
- in der Schwangerschaft.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid ist erforderlich**

- da PROCORDAL<sup>®</sup> liquid 51 Vol.-% Alkohol enthält.

**Bei Einnahme von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

**Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Auswirkungen von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung bisher nicht bekannt.

### 3. Wie ist PROCORDAL<sup>®</sup> liquid einzunehmen?

Nehmen Sie PROCORDAL<sup>®</sup> liquid immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene halbstündlich bis stündlich, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von PROCORDAL<sup>®</sup> liquid zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge PROCORDAL® liquid eingenommen haben, als Sie sollten**

ist lediglich der Alkoholgehalt (51 Vol.-%) des Arzneimittels zu berücksichtigen.

**Wenn Sie die Einnahme von PROCORDAL® liquid vergessen haben**

holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Nehmen Sie aber nicht die doppelte Dosis ein.

**Wenn Sie die Einnahme von PROCORDAL® liquid abbrechen**

können sich Ihre Beschwerden wieder verschlimmern oder erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann PROCORDAL® liquid Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

*Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10*

*Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100*

*Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000*

*Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000*

*Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000*

*Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

Bei der Anwendung von PROCORDAL® liquid wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

**Hinweise:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldungen von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist PROCORDAL® liquid aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen :**

Stets dicht verschlossen aufbewahren!  
Dieses Arzneimittel benötigt keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen.

**6. Weitere Informationen****Was PROCORDAL® liquid enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 ml Mischung enthalten:  
Camphora Dil. D1 0,1 ml  
Crataegus Ø 9,9 ml  
1 ml entspricht 36 Tropfen.

Enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

**Wie PROCORDAL® liquid aussieht und Inhalt der Packungen:**

PROCORDAL® liquid ist abgefüllt in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und in Originalpackungen mit 20 ml, 50 ml und 100 ml Mischung erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

COMBUSTIN  
pharmazeutische Präparate GmbH  
Offfinger Str. 7  
D-88525 Hailtingen

Tel. 0 73 71 / 96 53 56  
Fax 0 73 71 / 96 53 58

[info@combustin.de](mailto:info@combustin.de)  
[www.combustin.de](http://www.combustin.de)

**Hersteller**

Spreewälder Arzneimittel GmbH  
Schulstraße 9  
15913 Märkische Heide

[info@spreewaelder-arzneimittel.de](mailto:info@spreewaelder-arzneimittel.de)  
[www.spreewaelder-arzneimittel.de](http://www.spreewaelder-arzneimittel.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2016.**