

Redumin N forte 90 Kapseln

Zur Unterstützung der Behandlung von Übergewicht (BMI*>26) mit einer Reduktionsdiät
Medizinprodukt

Gebrauchsinformation:

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen die Redumin N forte kapseln jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Zusammensetzung:

1 Kapsel Redumin N forte enthält als Wirkstoff 450 mg Polymer aus **β —1,4-DGlucosamin und β -1,4-Acetyl-Glucosamin**. Sonstige Stoffe: Sorbit, Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Kapselhülle: Cellulose.

Darreichungsform und Inhalt:

OP mit 90 Redumin N forte Kapseln.

Anwendungsgebiete:

Redumin N forte Kapseln dienen zur Unterstützung der Behandlung von Übergewicht (BMI*>26) mit einer Reduktionsdiät.

*BMI=Body Mass Index

Gegenanzeige:

Bei folgenden Erkrankungen dürfen Redumin N forte Kapseln nicht eingenommen werden.

- Entzündliche Erkrankungen der Speiseröhre, Magenschleimhautentzündung
- Chronische entzündliche Darmerkrankung, Erkrankung des Dickdarms
- Anzeichen eines Darmverschlusses
- Verzögerter Magenentleerung (Magenlähmung)
- Bei Diabetikern mit Erkrankung des peripheren Nervensystems, Neuropathie
- Darmpolypen, chronische Obstipation, Hämorrhoiden
- Bei notwendiger Einnahme valproinsäurehaltiger Arzneimittel
- Bekannter Allergie gegen Schalentiere oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe
- Kinder unter 14 Jahren
- Untergewicht (BMI<18,5)

Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:

Bisher nicht bekannt. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Redumin N forte Kapseln jedoch nicht unmittelbar mit anderen Arzneimitteln zusammen eingenommen werden, sondern es sollte ein Einnahmeabstand von 1-2 Stunden eingehalten werden.

Nebenwirkungen:

Während der Einnahme von Redumin N forte Kapseln kann es zu einem vorübergehenden Druck- und Völlegefühl kommen, das sich in der Regel nach kurze Zeit legt. In Einzelfällen können Beschwerden auftreten bei Personen mit empfindlichem Magen und Darm. Falls diese länger als 2 Tage anhalten oder weitere Nebenwirkungen auftreten, sollte die Einnahme reduziert oder die Behandlung beendet werden. Beim Auftreten hier nicht genannter Nebenwirkungen befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und brechen die Behandlung ab.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Zur Gewichtsreduzierung im Rahmen einer Reduktionsdiät zu den Hauptmahlzeiten je 5 Redumin N forte Kapseln (max. 2 x täglich) einnehmen. Damit Redumin N forte Kapseln ihre optimale Wirkung entfalten können, sollten sie zusammen mit reichlich, möglichst kalorienarmer Flüssigkeit (300ml) eingenommen werden. Generell empfiehlt es sich, auf eine reichliche Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 l täglich) zu achten.

Warnhinweis:

Kapseln mit viel Flüssigkeit schlucken. Nur unbeschädigte, verschlossene Kapseln einnehmen, nicht lutschen, kauen oder zerbeißen, damit der Kapselinhalt nicht schon im Mund oder in der Speiseröhre freigesetzt wird.

Einnahmebeschränkung:

Fettlösliche Arzneimittel („Antibabypille“), Vitamine oder essentielle Fettsäuren nicht gleichzeitig mit Redumin N forte Kapseln einnehmen, da es zu einer Adsorption kommen kann. Einen Einnahmeabstand von mindestens 4 Stunden beachten.

Bei langfristiger, regelmäßiger Medikamenteneinnahme ist vor der Einnahme von Redumin N forte Kapseln ärztlicher Rat einzuholen.

Bei einer zeitlich begrenzten Behandlung mit Medikamenten/Antibiotika, die zu den Mahlzeiten einzunehmen sind, ist die Anwendung von Redumin N forte Kapseln nur nach ärztlicher Rücksprache vorzunehmen. Bei einer empfohlenen Unterbrechung kann die Einnahme von Redumin N forte Kapseln nach Beendigung der Medikamenten-/Antibiotikabehandlung wieder aufgenommen werden.

Haltbarkeitshinweis:

Nach dem Verfalldatum (Symbol Eieruhr), angebracht auf Faltschachtel und Etikett, sollten Redumin N forte Kapseln nicht mehr verwendet werden.

Aufbewahrung:

Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vertrieb:

Canea Pharma GmbH
Tarpenring 12
22419 Hamburg
Telefon: 040-53718880
Fax: 040-5277727

Hersteller:

C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1
33161 Hövelhof

PZN 00692446

Stand der Information: September 2016