

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
---	---	---

1. Bezeichnung

Roter Ginseng Instant Tee

2. Warengruppe

Vital – Roter Ginseng

3. Packungsgrößen

Dieses Produkt ist in jeder Apotheke in Deutschland, bei gut sortierten Fachhändlern und in vielen Internetshops erhältlich. Folgende Packungsgrößen sind derzeit verfügbar:

Größe	PZN*	Artikel-Nr.
50 g	08408114	00511

* Pharmazentralnummer: mit dieser zentralen Nummer können Sie den Artikel in jeder Apotheke in Deutschland (auch online) bestellen.

4. Rechtlicher Status

Arzneimittel

5. Mitgeltende Unterlagen

Packungsbeilage (als pdf-Datei)

6. Logo

entfällt

7. Werbetexte

7.1 Anleser (Teaser)

Pflanzliches Arzneimittel aus der Wurzel des Panax Ginseng zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeit und Schwächegefühl.

7.2 Produktmerkmale

- höchste Qualität
- Panax Ginseng C.A. Meyer
- ausgewogenes Ginsenosid-Spektrum
- 12 – 16 % Ginsenosidgehalt im Konzentrat

7.3 Produktbeschreibung

Koreanischer Reiner Roter Ginseng Instant Tee ist die ideale Lösung bei mangelnder Antriebskraft, Ermüdung und Anspannung. Bei Stress und erhöhter Leistungsanforderung fördert er die Konzentrationsfähigkeit, verleiht neue Energie sowie Vitalität und beugt Erschöpfung vor. Zudem stärkt Ginseng die Abwehrkräfte und wirkt bei Unruhezuständen beruhigend und ausgleichend. In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird Reiner

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
---	---	--

Roter Ginseng wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung bereits seit Jahrtausenden als natürliches Heilmittel geschätzt. Er wird hier unter anderem gegen Immunschwäche, Schwindel, Sehstörungen und Herzprobleme sowie nach langer Krankheit und Operationen eingesetzt.

8. Anwendungsinformationen

8.1 Wie ist die Zusammensetzung?

Zusammensetzung: 1 g Granulat (= 2 Messlöffel) enthält: **arzneilich wirksame Bestandteile:** 72 mg Trockenextrakt aus roter (wasserdampfbehandelter) Ginsengwurzel (2,2-3,8 : 1), Auszugsmittel: Ethanol 60% (V/V). **Sonstige Bestandteile:** Maltodextrin, Povidon K25

8.2 Wie ist die Anwendung?

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Nehmen Sie Roter Ginseng Instant Tee N immer genau nach Anweisung ein. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren 2 x täglich 1 Tasse mit 2,5 g Granulat (= 5 Messlöffel). 5 Messlöffel (ca. 2,5 g Granulat) Roter Ginseng Instant Tee N in eine Tasse geben, mit siedendem Wasser (ca. 100 ml) übergießen und umrühren.

Hinweis: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu Stark oder zu schwach ist.

Dauer der Anwendung: Roter Ginseng Instant Tee N sollte in der Regel bis zu 3 Monate angewendet werden. Wegen der fortdauernden Wirkung von Ginseng-Präparaten wird vor einer erneuten Anwendung eine Einnahmepause von einem Monat empfohlen.

Gegenanzeigen: Roter Ginseng Instant Tee N darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil Ginsengwurzel oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Nicht anwenden bei behandlungspflichtiger Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).

Wenn Sie dieses Arzneimittel einnehmen wollen, während Sie gleichzeitig blutgerinnungshemmende Medikamente vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen, sprechen Sie vorab mit Ihrem Arzt. In diesem Fall sollten engmaschige Kontrollen der Gerinnungswerte im Blut bis zu 14 Tage nach Absetzen dieses Arzneimittels erfolgen, um die Dosis der blutgerinnungshemmenden Medikamente anpassen zu können.

Das Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung abgeschwächt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
---	---	--

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zur Behandlung der Zuckerkrankheit sind möglich, wurden jedoch bisher nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch, wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Nebenwirkungen: Bei empfindlichen Personen können Übelkeit, Magenbeschwerden und leichter Durchfall auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

8.3 Was ist bei der Ernährung zu beachten?

entfällt

8.4 Aurica-Tipp

9. Webinformationen

9.1 Suchbegriffe

Vital, Vital - Roter Ginseng, Roter Ginseng, Tee, Tees, Arzneitee, Arzneitees, Arzneimittel, Roter Ginseng Instant-Tee, Roter Ginseng Instant - Tee, Roter Ginseng Instant Tee, Roter Ginseng Instanttee, Roter Ginseng Tee, Roter Ginseng-Tee, Roter-Ginsengtee, Roter Ginsengtee, Ginseng Tee, Ginseng-Tee, Ginsengtee, Koreanischer Ginseng Tee, Koreanischer Ginseng-Tee, Koreanischer Ginsengtee, Instanttee, Instant-Tee, Instant Tee, Tee, Ginsengtee, Ginseng-Tee, Ginseng Tee, Ginseng, Roter Ginseng, Roter-Ginseng, Roterginseng, Koreanischer Ginseng, Koreaginseng, Panax ginseng, Gilgen, Samwurzel, Kraftwurz, Korea, Stärkung, Kräftigung, Müdigkeit, Schwäche, Leistung, Leistungsfähigkeit, Konzentration, Konzentrationsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Stress, Erschöpfung

9.2 Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

Der Beipackzettel kann Ihr Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker nicht ersetzen. Nur diese können entscheiden ob und wann Sie ein Arzneimittel einnehmen müssen.

10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welcher Ginseng wird für Roter Ginseng Instant Tee verwendet?

Für unsere Ginseng-Produkte wird der Koreanische Ginseng (Panax Ginseng C.A. Meyer) eingesetzt. Diese Spezies ist in Korea zwischen dem 36. und 38. Breitengrad und der südlichen Mandschurei beheimatet.

Welche Teile des Ginsengs werden verwendet?

	Formblatt Produktinformation	Revision 00 gültig ab 01.04.2011
---	---	---

Unsere Ginseng-Produkte stammen aus den Wurzeln, bestehend aus Stamm-, Neben- und Haarwurzel.

Wie alt ist die Ginsengwurzel bei Verarbeitung?

Für die Ginseng-Produkte wird 5 – 6jähriger Ginseng verarbeitet, da er erst nach dieser Zeit ein Höchstmaß an Wirkstoffen, besonders die Ginsenoside, ausgebildet hat.

Wie wird der Rote Ginseng hergestellt?

Der rote Ginseng entsteht durch ein schonendes Dämpfungsverfahren nach der Ernte. Dieses traditionelle Verfahren wird nur bei erstklassigen fünf und sechs Jahre alten Wurzeln angewendet. Es dient zum einen der natürlichen Konservierung der Wirkstoffe, zum anderen wandeln sich durch diesen Prozess Ginsenoside der Rg-Gruppe in Rh-Ginsenoside um. Rh-Ginsenoside wird eine besondere Bedeutung für die Stärkung des Immunsystems und die Bekämpfung der „freien Radikale“ zugeschrieben.

Was sind Ginsenoside?

Ginsenoside gehören zu den Phytoestrogenen (Phytoöstrogenen). Diese pflanzlichen Stoffe ähneln in ihrer Wirkung den menschlichen Östrogenen. Für Ginsenoside wurden verschiedene Effekte beschrieben, die einen positiven Einfluss auf die Behandlung von Krebszellen haben.

Welche Stoffe sind in Panax Ginseng neben den Ginsenosiden enthalten?

Neben den Ginsenosiden sind wertvolle Vitamine, wie z.B. Vitamin C, Vitamine der B-Gruppe, Folsäure sowie Mineralien und Spurenelemente enthalten

*** Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. Mit Erscheinen verlieren alle zuvor ausgestellten Produktinformationen dieses Artikels ihre Gültigkeit. ***