

# Produktdaten – Sagrotan med Sprühdesinfektion

## Packungsgrößen / Varianten

Sagrotan med Sprühdesinfektion 250 ml

PZN-Pharma-Zentral-Nummer: 3911624

Zul.-Nr.: 9879.00.00

## Inhaltsstoffe / Produktzusammensetzung

Pro 100 g:

35 g 1-Propanol

25 g Ethanol (96 %)

0,1 g Glyoxal

Alkyl (C10-C12)ω-hydroxypoly(oxyethylen)-4-poly (oxypropylen)-6, 1H-Benzotriazol, Wasser gereinigt, Parfumöle

## Aussehen

Klare, farblose Flüssigkeit in einer Pumpspray-Flasche.

## Produkt-Chargencode / Verfallsdatum

Mit Klarsichtlabel angebracht, z. B. Ch.-B. 1070986 verwendbar bis 10/2006

Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren.

# Produktleistung – Sagrotan med Sprühdesinfektion

Feindesinfektion für Haut, Gegenstände und Flächen.

Wirksam gegen schädliche Bakterien, Pilze und spezielle Viren. Sagrotan med Sprühdesinfektion wirkt schnell und zuverlässig gegen Bakterien inkl. TbB, Pilze und spezielle Viren, wie z. B. HBV (geprüft im MAD-Test). Sagrotan med Sprühdesinfektion trocknet nach dem Aufsprühen rasch an und ist gegenüber Bakterien und Pilzen bereits in 5 Minuten wirksam.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Darreichungsform: Lösung

### Anwendungsgebiete:

- Desinfektion der Haut, insbesondere der Füße, auch bei der Möglichkeit der Pilzinfektionen.
- Desinfektion von Gegenständen und Flächen wie z. B. Bettgestelle, medizinische Geräte, Waagen, Schuhe, Türklinken, Telefone, WC-Sitze etc.

# Gebrauchsanweisung – Sagrotan med Sprühdesinfektion

- **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet: Bei Bedarf Haut oder Flächen bis zur vollständigen Benetzung mit dem unverdünnten Präparat einsprühen und einwirken lassen.

- **Einwirkzeit**

Hautdesinfektion (auch bei der Möglichkeit von Pilzinfektionen): bis zum Antrocknen (ca. 5 Minuten).

Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe (gem. Liste DGHM Stand: 17.9.1997): 15 Minuten.

Flächendesinfektion bei TbB: 30 Minuten.

# Sicherheitshinweise – Sagrotan med Sprühdesinfektion

- Augenkontakt vermeiden.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Alkoholempfindliche Oberflächen (z. B. Acrylglas) dürfen nicht besprüht werden.
- Materialien vor der Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Farbechtheit prüfen.
  
- Das Behältnis soll nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.
- **Entzündlich:** Nicht in offene Flamme sprühen (26° C Flammpunkt nach DIN 51755).
- Ausbringung maximal 50 ml/m<sup>2</sup>.
- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.