


# Sanimastin® 10%

## Eutersalbe

- Für Tiere:  
Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Hunde, Katzen,  
Zootiere (z. B. Schlangen, Wildvögel, Huftiere)
- Apothekenpflichtig



**Sanimastin® 10%**

**Wirkstoff:** Ranzonischer Complex  
**Salbe zum Auftragen auf die Haut**  
 Für Tiere: Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, Zootiere  
 z. B. Schlangen, Wildvögel, Huftiere

**Gebrauchsinformation**  
 100 g Salbe enthält:  
 Anzahl aktiver Bestandteile: Ranzonischer Complex 10,0 g  
**Benennung des Produktes und Inhalt**  
 Salbe, 100 g  
**Salbenabgabe**  
 Ranzonischer Complex

**Pharmazeutische Informationen:**  
 Virbac, Berlin, 100, Hafestraße, Leubitz 105 5, 04415 Berlin  
 Abgabedatum: 10/09/2009  
**Anwendungsgebiete**  
 Chronische und akute Euterentzündungen bei Ziegen, Schafen und Säuglingskühen  
**Wirkung**  
 Regenerative Akut- und Heilung von Abszessen  
 Entzündungshemmend  
 Glycerin  
**Spezialanwendung**  
 Nicht auf das primäre Euter sowie auf Schenkelsäule auftragen.  
 Bei Euterentzündungen: Salbe direkt für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.  
 Bei Euterentzündungen für die Anwendung:  
 Die Körper- und Schenkelsäule und Haut über Abszessen ist zu vermeiden. Bei der  
 Anwendung sollte Handschuhe getragen werden.

**Virbac**  
 04-03-02003

## Zusammensetzung:

### 100 g Salbe enthalten:

Campher ..... 10,0 g

## Anwendungsgebiete:

- Chronische und subakute Entzündungen der Gelenke, Sehnen und Sehnen-scheiden, Mastitis
- Beginnende Abszesse, zur Reifung von Abszessen
- Schleimbeutelentzündungen
- Lymphdrüsenentzündungen
- Quetschungen (stumpfe Traumata)
- Phlegmone

## Gegenanzeigen:

Nicht auf geschädigte Haut sowie auf Schleimhäute aufbringen.

## Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung von Sanimastin 10 % stehen könnten, sind nicht bekannt.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

### Lokale Applikation auf die Haut.

Die Dosierung richtet sich nach der Ausdehnung des zu behandelnden Hautbezirkes.

Das erkrankte Hautgebiet wird ein bis mehrmals täglich eingerieben.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Heilungsverlauf.

1 – 8 Tage bis zur Besserung entzündlicher Krankheitsbilder.

## Wartezeit:

### Rind, Schaf, Ziege, Pferd, Schwein

Essbare Gewebe.....3 Tage

### Rind, Schaf, Ziege

Milch .....3 Tage