

Sanum

Sanukehl® Acne D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Propionibacterium acnes e volumine cellulae D6
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Propionibacterium acnes e volumine cellulae D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5 a, mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Zum Einnehmen: Bei akuten Zuständen 5-10 Tropfen vor einer Mahlzeit alle 12-24 Stunden; bei chronischen Verlaufsformen 10 Tropfen jeden 2. Tag. Zum Einreiben in die Haut: Alle 1-2 Tage 5-10 Tropfen in die Ellenbeugen. Nach 8 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Acne D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl Acne® D6

beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Dauer der Behandlung:

Handelsform:

10 ml Tropfflasche
10x 10 ml Bündelpackung.