

# Sanum

## Sanukehl® Prot D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Proteus vulgaris e volumine cellulae D6
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Proteus vulgaris e volumine cellulae D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	<p>Zum Einnehmen:            Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen 5-10 Tropfen vor einer Mahlzeit alle 12-24 Stunden; bei chronischen Verlaufsformen 10 Tropfen jeden 2. Tag.</p> <p>Zum Einreiben in die Haut:            Alle 1-2 Tage 5-10 Tropfen in die Ellenbeugen.            Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Sanukehl® Prot D6 abgesetzt werden.</p>
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Prot D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Proteus vulgaris ausgelöst werden.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei &#8226; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Proteus-Arten &#8226; Autoimmunerkrankungen

- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Sanukehl® Prot D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform: 10 ml Tropfflasche  
10x 10 ml Bündelpackung.