

Sanum

Sanuvis® Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12/D30/D200 Potenzakkord
Zusammensetzung:	2 ml enthalten: 0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D4 aquos. (HAB, V. 5b), 0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D6 aquos. (HAB, V. 5b), 0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D12 aquos. (HAB, V. 5b), 0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D30 aquos. (HAB, V. 5b), 0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D200 aquos. (HAB, V. 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Kinder aller Altersgruppen 1-3x wöchentlich 2 ml i.m. injizieren.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt; siehe Vorsichtsmaßnahmen.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sanuvis® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zusatzhinweis:	

Dauer der Behandlung:

Handelsform:

10/50 Ampullen à 2 ml,
Bündelpackung 10x 50 Ampullen à 2 ml.