

**Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender**

# Siccapos® Gel

## 2,0 mg/g, Augengel

**Wirkstoff: Polyacrylsäure (Carbomer 980)**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Siccapos® Gel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist **Siccapos® Gel** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Siccapos® Gel** beachten?
3. Wie ist **Siccapos® Gel** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Siccapos® Gel** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Siccapos® Gel und wofür wird es angewendet?**

**Siccapos® Gel** ist ein Tränenersatzmittel bei mangelnder Tränenproduktion und trockenem Auge.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Siccapos® Gel beachten?**

**Siccapos® Gel** darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von **Siccapos® Gel** sind,
- während Sie Kontaktlinsen tragen.

### **Bei Anwendung von Siccapos® Gel mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Hinweis:**

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 5 Minuten zwischen den Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. **Siccapos® Gel** sollten Sie stets als letztes anwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Sie dürfen unmittelbar nach Anwendung von **Siccapos® Gel** kein Fahrzeug führen, weil dieses Arzneimittel auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch vorübergehend die Sehschärfe beeinflusst und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr.

Sie dürfen dann auch vorübergehend keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.

### **3. Wie ist Siccapos® Gel anzuwenden?**

Wenden Sie **Siccapos® Gel** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die Therapie des trockenen Auges erfordert eine individuelle Dosierung. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis je nach Schwere und Ausprägung der Beschwerden 3 bis 5 mal täglich und häufiger und vor dem Schlafengehen 1 Tropfen in den Bindehautsack einzutropfen.

Verteilen Sie die Anwendungen von **Siccapos® Gel** gleichmäßig über den Tag.

Die genaue Behandlungsdauer ist vom individuellen Krankheitsbild abhängig und wird vom Arzt bestimmt. Bei der Behandlung der trockenen Augen, die in der Regel als Langzeit- oder Dauertherapie erfolgt, sollte ein Augenarzt konsultiert werden.

Gele zur Anwendung am Auge sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tubenspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Tube einen Tropfen des Gels in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Tube wieder sorgfältig verschlossen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Siccapos® Gel** zu stark oder zu schwach ist.

### Wenn Sie eine größere Menge Siccapos® Gel angewendet haben, als Sie sollten

sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie Ihre Behandlung in der üblichen Dosierung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Siccapos® Gel** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000	Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

#### Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe kommen.

**Siccapos® Gel** enthält das Konservierungsmittel Cetrimid, das insbesondere bei häufiger und längerer Anwendung Reizungen des Auges (Brennen, Rötungen, Fremdkörpergefühl) hervorrufen und das Hornhautepithel schädigen kann. Für die Langzeitbehandlung der chronischen Keratokonjunktivitis sicca sollten daher Präparate ohne Konservierungsmittel bevorzugt werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. Wie ist Siccapos® Gel aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Sie dürfen **Siccapos® Gel** nach Anbruch nur 4 Wochen verwenden.

#### 6. Weitere Informationen

Was **Siccapos® Gel** enthält:

Der Wirkstoff ist Polyacrylsäure (Carbomer 980) 2,0 mg/g.

Die sonstigen Bestandteile sind Sorbitol (Ph.Eur.), Cetrimid (Konservierungsmittel), Wasser für Injektionszwecke, Natriumhydroxid, Natriumedetat (Ph.Eur.).

#### Wie Siccapos® Gel aussieht und Inhalt der Packung:

**Siccapos® Gel** ist ein klares Gel, das in Aluminiumtuben mit Schraubverschluss abgefüllt ist.

Jede Packung enthält entweder 1 oder 3 Tuben mit 10 g Augengel.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Industriestraße  
D-66129 Saarbrücken  
Tel.: 06805/92 92-0  
Fax: 06805/92 92-88  
Email: info@ursapharm.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

März 2007

#### Allgemeine Hinweise für den Patienten:

Bitte entnehmen Sie das Gel durch sanftes Ausdrücken der Tube ohne Knicken und Aufrollen.

