Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sophtal-POS® N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Sophtal-POS® N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Sophtal-POS® N beachten?
3. Wie ist Sophtal-POS® N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sophtal-POS® N aufzubewahren?

Sophtal-POS® N

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Salicylsäure.
1 ml Lösung enthält 1,0 mg Salicylsäure (Ph.Eur.)

Die sonstigen Bestandteile sind:
Chlorhexidindigluconat-Lösung (Ph.Eur.), Borsäure, Natriumtetraborat • 10 H_2O, Natriumchlorid, Natriumedetat (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke

Sophtal-POS® N ist in Packungen mit 10 ml Augentropfen und 3 x 10 ml Augentropfen erhältlich.

1. Was ist Sophtal-POS® N und wofür wird es angewendet?

1.1 Sophtal-POS® N wirkt gegen Entzündungen des Auges.

1.2 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
URSAPHARM, Industriestr. 35, D-66129 Saarbrücken,
Tel.: 06805/92 92-0, Fax: 06805/92 92-88, Email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

1.3 Sophtal-POS® N wird angewendet zur symptomatischen Therapie bei Lidrandentzündungen (Blepharitiden), unspezifischen Bindehautentzündungen, Reizzuständen durch Staub, Rauch, Sonne.

Bei infektiösen Erkrankungen nicht ohne adequate antiinfektiöse Begleittherapie.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Sophtal-POS® N beachten?

2.1 Sophtal-POS® N darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile.

Während der Anwendung von Sophtal-POS® N sollten keine Kontaktlinsen getragen werden.
Bei Augenverletzungen sollte Sophtal-POS® N nicht angewendet werden.

Beachten Sie bitte, dass eine Augenreizung oder eine Augenrötung häufig auch ein Zeichen für eine ernste Augenerkrankung sein kann und Sie daher einen Augenarzt befragen sollten.
Suchen Sie sofort den nächsten erreichbaren Augenarzt auf, wenn
- die Augenrötung akut oder einseitig auftritt
- zu Ihren jetzigen Beschwerden Augen- oder Kopfschmerzen hinzukommen
- Sie eine Sehverschlechterung oder fliegende Punkte vor den Augen bemerken

a) Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Sophtal-POS® N darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt angewendet werden.

b) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Dieses Arzneimittel beeinflusst auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch vorübergehend und kurzfristig die Sehschärfe und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen.

c) Wichtige Warnhinweise zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Sophtal-POS® N
Wenn trotz der vorliegenden Augenerkrankung keine Einwände gegen das Tragen von Kontaktlinsen bestehen, sollten vor dem Eintropfen des Präparates in den Bindehautsack die Kontaktlinsen vom Auge genommen werden und nach etwa 15 Minuten wieder aufgesetzt werden. Wegen der Gefahr einer Materialtrübung muss eine direkte Berührung mit weichen Kontaktlinsen ausgeschlossen werden.

URSAPHARM
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

32.362 LDA BD 9601

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hinweis:

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 15 Minuten zwischen den Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. Augensalben sollten Sie stets als letztes anwenden.

3. Wie ist Sophtal-POS® N anzuwenden?

Wenden Sie Sophtal-POS® N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zur Anwendung am Auge.

Augentropfen sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Flasche wieder sorgfältig verschlossen werden.

Verteilen Sie die Anwendung von Sophtal-POS® N gleichmäßig über den Tag.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

4 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Sophtal-POS® N sollte bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden. Die genaue Behandlungsdauer bestimmt der Arzt. Eine Anwendung über 14 Tage sollte in der Regel nicht erfolgen. Eine Daueranwendung sollte nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Sophtal-POS® N zu stark oder zu schwach ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Sophtal-POS® N Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig: Bei mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Bei mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Bei mehr als 1 von 1.000 Behandelten	Selten: Bei mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: Bei 1 oder weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen oder Kontaktallergien, gelegentlich leichtes Augenbrennen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist Sophtal-POS® N aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch ist Sophtal-POS® N nur 4 Wochen verwendbar.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Stand der Information:
Oktober 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Darreichungsform:
Sophtal-POS® N Augenbad mit 200 ml Lösung und beiliegender Augenbadewanne

32.362 LDA