

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

## **Spenglersan® G-Rhinol**

Homöopathisches Arzneimittel zur nasalen Anwendung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren

Apothekenpflichtig

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sowie die Information auf der Innenseite dieses Etiketts sorgfältig durch, denn sie enthalten wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Spenglersan® G-Rhinol** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist **Spenglersan® G-Rhinol** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Spenglersan® G-Rhinol** beachten?
3. Wie ist **Spenglersan® G-Rhinol** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Spenglersan® G-Rhinol** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Spenglersan® G-Rhinol und wofür wird es angewendet?**

1.1 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

*Hinweis:* Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan® G-Rhinol beachten?**

2.1 **Spenglersan® G-Rhinol darf nicht angewendet** werden bei

- Überempfindlich gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen, einem der sonstigen Bestandteile, Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütler)
- Bronchialasthma u. a. Atemwegserkrankungen mit ausgeprägter Überempfindlichkeit der Atemwege
- Kindern unter 2 Jahren.

2.2 **Besondere Vorsicht** bei der Anwendung von **Spenglersan® G-Rhinol** ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **Spenglersan® G-Rhinol** in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei der Anwendung des Arzneimittels bei älteren Menschen und für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen von 2-18 Jahren erfolgt nur nach Rücksprache mit dem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

### **2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

*Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **3. Wie ist Spenglersan® G-Rhinol anzuwenden?**

Zur Dosierung, Dauer und Art der Anwendung befragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Die Einzelgabe eines homöopathischen Arzneimittels sollte möglichst klein sein. Nach jeder Gabe ist die Wirkung abzuwarten. Erstverschlimmerung und Arzneimittelprüfsymptomatik sind zu berücksichtigen.

**3.2 Art der Anwendung** (nasale Anwendung): Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Nase und ziehen Sie das Arzneimittel hoch. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise in die Nase zu sprühen. *Hinweis:* Bei Anwendung mehrerer Spenglersan® Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden.

Vor dem Benutzen die Verschlusskappe entfernen.

Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und pumpen.

Nach der Anwendung die Schutzkappe wieder aufsetzen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Spenglersan® G-Rhinol** zu stark oder zu schwach ist.

**3.3** Wenn Sie eine größere Menge von **Spenglersan® G-Rhinol** angewendet haben als Sie sollten, ist nicht mit Intoxikationen zu rechnen.

**3.4** Wenn Sie die Anwendung von **Spenglersan® G-Rhinol** vergessen haben, holen Sie diese Anwendung nicht nach, sondern fahren Sie mit der nächsten fort.

**3.5** Wenn Sie die Anwendung von **Spenglersan® G-Rhinol** abbrechen, können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt bzw. Therapeuten befragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

*Hinweis:* Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

### **5. Wie ist Spenglersan® G-Rhinol aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Flasche nach Gebrauch stets gut verschließen.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch des Behältnisses soll **Spenglersan® G-Rhinol** nicht länger als 6 Monate verwendet und nicht über 25°C aufbewahrt werden.

## 6. Weitere Informationen

Was **Spenglersan® G-Rhinol** in 10 g enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Antigene aus Influenza A Virus  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58a) 1,67 g

Antitoxine aus Influenza A Virus  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58b) 1,67 g

Antigene aus Haemophilus influenzae  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58a) 1,67 g

Antitoxine aus Haemophilus influenzae  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58b) 1,67 g

Antigene aus Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58a) 1,67 g

Antitoxine aus Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58b) 1,67 g

gemeinsam potenziert über 8 Stufen.

Sonstige Bestandteile: Thymol, Salzsäure 25% (m/V)

1 Sprühstoß entspricht 0,6 Tropfen

**Spenglersan® G-Rhinol** sind Nasentropfen zur nasalen Anwendung und in einer Sprühflasche mit 20 ml erhältlich.

Reg.-Nr.: 80331.00.00

Ch.-B.:

verwendbar bis:

Meckel-Spenglersan GmbH • Steinfeldweg 13 • 77815 Bühl • Tel: (07223) 3 06 71 • Fax:  
(07223) 87 13 • E-Post: [info@spenglersan.de](mailto:info@spenglersan.de) • <http://www.spenglersan.de>

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2012.

---

### Weitere Angaben

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der MECKEL-SPENGLERSAN GmbH erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschland und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre MECKEL-SPENGLERSAN GmbH