

tetesept:

Husten Saft Bronchial-activ

10 g/100 ml Sirup

Wirkstoff:
Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss tetesept Husten Saft Bronchial-activ jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ beachten?

3. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ und wofür wird er angewendet?

tetesept Husten Saft Bronchial-activ ist ein pflanzliches Mittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege.

Anwendungsgebiet:

Erkältungskrankheiten der Atemwege, entzündliche Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Bei länger dauernden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ beachten?

tetesept Husten Saft Bronchial-activ darf nicht eingenommen werden: Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Spitzwegerich-Fluidextrakte, Methyl(4-hydroxybenzoat) (Paraben E 218), Propyl(4-hydroxybenzoat) (Paraben E 217) oder einen der sonstigen Bestandteile von tetesept Husten Saft Bronchial-activ sind.

Kinder:

Zur Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Er soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwen-

dung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

tetesept Husten Saft Bronchial-activ sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen nicht in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von tetesept Husten Saft Bronchial-activ:

Dieses Arzneimittel enthält 2,5Vol.-% Alkohol.

Dieses Arzneimittel enthält den Zucker Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie tetesept Husten Saft Bronchial-activ erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

10 ml (1 Messbecher) enthalten 6,79 g Sucrose (Zucker), entsprechend 0,57 BE. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

3. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ einzunehmen?

Nehmen Sie tetesept Husten Saft Bronchial-activ immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamt-dosis
Kleinkinder ab 1 Jahr bis unter 4 Jahren	5 ml 3-4 mal täglich	15 ml bis 20 ml
Kinder ab 4 bis unter 12 Jahren	7,5 ml 3-4 mal täglich	22,5 ml bis 30 ml
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren	10 ml Saft 3-4 mal täglich	30 ml bis 40 ml

Dauer der Anwendung:

tetesept Husten Saft Bronchial-activ kann bis zum Abklingen der Beschwerden eingenommen werden. Beachten Sie jedoch die Angaben unter „Anwendungsgebiete“. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von tetesept

Husten Saft Bronchial-activ zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge tetesept Husten Saft Bronchial-activ eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungen mit Zubereitungen aus Spitzwegerich sind bisher nicht bekannt geworden. Möglicherweise treten bei der Einnahme zu großer Mengen von tetesept Husten Saft Bronchial-activ die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ vergessen haben:

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ abbrechen:

Eine Unterbrechung oder die vorzeitige Beendigung der Einnahme von tetesept Husten Saft Bronchial-activ ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann tetesept Husten Saft Bronchial-activ Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

- **Sehr häufig:** mehr als 1 von 10 Behandelten
- **Häufig:** weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
- **Gelegentlich:** weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
- **Selten:** weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
- **Sehr selten:** weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Methyl(4-hydroxybenzoat) (Paraben E 218) und Propyl(4-hydroxybenzoat) (Paraben E 217) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist tetesept Husten Saft Bronchial-activ aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25°C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein halbes Jahr.

6. Weitere Informationen

Was tetesept Husten Saft Bronchial-activ enthält:

Der Wirkstoff ist:
100 g (entsprechend 79,37 ml) Sirup enthalten:
Fluidextrakt aus
Spitzwegerichkraut 1:1 10 g
Auszugsmittel: Ethanol 24,6% (V/V)
Enthält 2,5 Vol.-% Alkohol.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (Paraben E 217), Sucrose (Zucker), gereinigtes Wasser.

Hinweis für Diabetiker:

10 ml enthalten 6,79 g Saccharose (entsprechend 0,57 BE), 5 ml enthalten 3,40 g Saccharose (entsprechend 0,29 BE).

Wie tetesept Husten Saft Bronchial-activ aussieht und Inhalt der Packung:
Originalpackung mit 150 g Sirup.

Pharmazeutischer Unternehmer:



Marschnerstraße 10
60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2008 (Druck 03/2011)

