



Kl.-Nr.: 95HK1245 1K 2E

Gr.: 40/155 mm

Tubenschulter / Dosenboden

Farbe: schwarz blau PMS 299C

13.07.2006/cw

Gebrauchsinformation

Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g Gel enthalten: 0,2 g Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein), entspre-

chend 30.000 I.E.

Sonstige Bestandteile: Carboxymethylcellulose 80, Polysorbat 80, Natriumacetat, Triethanolamin, Poly(oxyethylen), Kierternadelöl, (mono,di)-alkanoat (C₈-C₁₀), Läschenkieferöl, Kierternadelöl, Levomenthol, Z-Propandiol, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackung mit 100 g Gel

Zur Verminderung von Schwellungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Telefon: 03 49 54/2 47-0
Telefax: 03 49 54/2 47-100

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Fellungen/Blutergüssen).

Gegenanzeigen: Dieses Arzneimittel soll nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin-Natrium oder einen der sonstigen Bestandteile der Gelgrundlage.

Bisnürge Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben. Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

und Warnhinweise: Thrombocytan® 30.000 Gel N soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Thrombocytan® 30.000 Gel N soll 2-3 mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden. Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Thrombocytan® 30.000 Gel N ca. 1-2 Wochen anwenden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Überdosierungserscheinungen bekannt.

Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind selten ($\approx 0,01\%$ - $< 0,1\%$), jedoch können in Einzelfällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder der Apotheke mit. Thrombocytan® 30.000 Gel N sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: Februar 2006

Ch-B./Verwendbar bis: siehe Tubenfalz

mibe GmbH
Arzneimittel

Thrombocutan® 30.000 Gel N

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Zum Auftragen auf die Haut

100 g Gel N2

Zul.-Nr. 6081955.00.01

Apothekenpflichtig

Bitte Gebrauchsinformation beachten!



PZN -3959329

— Bitte Tube auf den Kopf stellen —